

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJLARI

	Yaprak Uygulama	Damlama Toprak Uygulama
Sebzelerde	150 - 200 ml	500-750 ml
Meyvelerde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml
Tahıllar, Endüstri Bitkilerinde	150 - 200 ml	500 - 750 ml
Süs Bitkilerinde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml

KÜKÜRTÜN BİTKİLER İÇİN ÖNEMİ:

Kükürt vitamin H ve vitamin B1'in yapı taşıdır. Sistein ve Metionin aminoasitlerinin bileşenidir. Bitkilerde kükürt (S) noksanlığında kök hidrolik geçirgenliği, stoma açıklıkları ve fotosentez azalır. Kükürt noksanlığında protein sentezi azalır.

FİRMA BEYANI

Ürünün bizim kontrolümüzde olmayan hatalı öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygulugu, sadece ürünün teslimatı sırasında firma garantisi altındadır.

DEPOLAMA

Ürünü serin, kuru ve havadar bir yerde muhafaza ediniz, güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz. Depolama sıcaklığı: **0 - +45 °C** (Derece) olmalıdır.

NET: 20 L

800 g/L SC Formunda
Mikronize Elementel
Sıvı Kükürt

SULFOMOST 80 SC

UYARILAR

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatle okuyunuz,
- * Çocuklardan uzak tutunuz.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, bulaştırmamaya çalışınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız, teneffüs etmeyiniz, yutmayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayın.
- * Kullandıktan sonra ambalajı imha ediniz ve boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra imha ediniz.
- * Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

TESCİL NO :
LİSANS NO :
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :



AGROMOST A.Ş.
AGROMOST TARIMSAL PAZARLAMA
SAN. VE TİC. A.Ş.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJLARI

	Yaprak Uygulama	Damlama Toprak Uygulama
Sebzelerde	150 - 200 ml	500-750 ml
Meyvelerde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml
Tahıllar, Endüstri Bitkilerinde	150 - 200 ml	500 - 750 ml
Süs Bitkilerinde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml

KÜKÜRTÜN BİTKİLER İÇİN ÖNEMİ:

Kükürt vitamin H ve vitamin B1'in yapı taşıdır. Sistein ve Metionin aminoasitlerinin bileşenidir. Bitkilerde kükürt (S) noksanlığında kök hidrolik geçirgenliği, stoma açıklıkları ve fotosentez azalır. Kükürt noksanlığında protein sentezi azalır.

FİRMA BEYANI

Ürünün bizim kontrolümüzde olmayan hatalı öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygulugu, sadece ürünün teslimatı sırasında firma garantisi altındadır.

DEPOLAMA

Ürünü serin, kuru ve havadar bir yerde muhafaza ediniz, güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız. Patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz. Depolama sıcaklığı: **0 - +45 °C** (Derece) olmalıdır.

NET: 20 L

800 g/L SC Formunda
Mikronize Elementel
Sıvı Kükürt

SULFOMOST 80 SC

UYARILAR

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatle okuyunuz,
- * Çocuklardan uzak tutunuz.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, bulaştırmamaya çalışınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız, teneffüs etmeyiniz, yutmayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayın.
- * Kullandıktan sonra ambalajı imha ediniz ve boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra imha ediniz.
- * Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

TESCİL NO :
LİSANS NO :
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :



AGROMOST A.Ş.
AGROMOST TARIMSAL PAZARLAMA
SAN. VE TİC. A.Ş.



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YERİNE (100 L su / da)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFALT, KAYI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sarıgöller 3-5 cm ile, sakam uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su süzleme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP PİSTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KİVİ, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANDOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 mL - 1 L
ŞEKER PANCARI, Tütün	Fırtına büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

- UYARILAR**
- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 - * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 - * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
 - * Teması halinde bol su ile yıkayınız.
 - * Önerilen dozajı aşmayınız.
 - * Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 - * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
 - * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
 - * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- DEPOLAMA**
- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerin **3 yıl** korur.
 - * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 - * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel :0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr