

EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

FuİN

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot % 25
Amonyum Azotu (N-NH₄) % 6
Nirat Azotu (N-NO₃) % 8
Üre Azotu (N-NH₂) % 11
Biüresi Düşüktür



EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

FuİN

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot % 25
Amonyum Azotu (N-NH₄) % 6
Nirat Azotu (N-NO₃) % 8
Üre Azotu (N-NH₂) % 11
Biüresi Düşüktür



EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

FuİN

Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot % 25
Amonyum Azotu (N-NH₄) % 6
Nirat Azotu (N-NO₃) % 8
Üre Azotu (N-NH₂) % 11
Biüresi Düşüktür



UYARILAR

- *Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- *Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- ***Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**
- *Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Diğer taban gübreleri, ilaçlar ve sıvı gübrelerle birlikte karıştırılarak kullanılabilir. Şüpheli durumlarda karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama ve taşıma esnasında koliler ters çevrilmemelidir.

Depolama sıcaklığı - 5 ile +35 derece arasında olmalıdır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız etiketin aynı olacağını taahhüt ederiz, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRO QUATRO Organik Tarım
San. Tic. A.Ş.
Egemenlik Mah. 6106/15 Sokak
No:13 Bornova İzmir Türkiye
Tel: +90 232 273 60 60
info@agroquattro.com
www.agroquattro.com

NET: 1 L

UYARILAR

- *Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- *Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- ***Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**
- *Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Diğer taban gübreleri, ilaçlar ve sıvı gübrelerle birlikte karıştırılarak kullanılabilir. Şüpheli durumlarda karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama ve taşıma esnasında koliler ters çevrilmemelidir.

Depolama sıcaklığı - 5 ile +35 derece arasında olmalıdır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız etiketin aynı olacağını taahhüt ederiz, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRO QUATRO Organik Tarım
San. Tic. A.Ş.
Egemenlik Mah. 6106/15 Sokak
No:13 Bornova İzmir Türkiye
Tel: +90 232 273 60 60
info@agroquattro.com
www.agroquattro.com

NET: 1 L

UYARILAR

- *Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- *Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- ***Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**
- *Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Diğer taban gübreleri, ilaçlar ve sıvı gübrelerle birlikte karıştırılarak kullanılabilir. Şüpheli durumlarda karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama ve taşıma esnasında koliler ters çevrilmemelidir.

Depolama sıcaklığı - 5 ile +35 derece arasında olmalıdır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız etiketin aynı olacağını taahhüt ederiz, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRO QUATRO Organik Tarım
San. Tic. A.Ş.
Egemenlik Mah. 6106/15 Sokak
No:13 Bornova İzmir Türkiye
Tel: +90 232 273 60 60
info@agroquattro.com
www.agroquattro.com

NET: 1 L



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI			
BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	SULAMA SUYU İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA (100 L SUDA)
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Fasulye, Kavun vb.	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Meyve Ağaçları	Vegatif gelişme dönemi boyunca 1-2 hafta ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Bağlar	Aktif gelişme döneminde	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Narenciye	Baharda sürgün gelişimi boyunca 10 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Fındık	Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	100 ml (122g) /Ocak	150-200 ml (183-244g)
Çilek	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	Aktif gelişme döneminde ve başaklanma öncesi	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Pamuk	Aktif gelişme süresince ve çiçeklenme öncesi	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Vegetatif gelişmenin yoğun olduğu dönemlerde 15-20 günde bir kez uygulanır. Sebzeler ve meyveler için sulama sistemleri ile veya topraktan 2-4 L /da Kesme çiçek içinse 1-3 L /da dozunda uygulanabilir.			

Lisans No : 1489
Tescil No : 33743
Parti/Seri No : Ambalajın üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.
Son Kull. Tarihi : Üretim Tarihinden İtibaren 5 Yıldır.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI			
BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	SULAMA SUYU İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA (100 L SUDA)
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Fasulye, Kavun vb.	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Meyve Ağaçları	Vegatif gelişme dönemi boyunca 1-2 hafta ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Bağlar	Aktif gelişme döneminde	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Narenciye	Baharda sürgün gelişimi boyunca 10 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Fındık	Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	100 ml (122g) /Ocak	150-200 ml (183-244g)
Çilek	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	Aktif gelişme döneminde ve başaklanma öncesi	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Pamuk	Aktif gelişme süresince ve çiçeklenme öncesi	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Vegetatif gelişmenin yoğun olduğu dönemlerde 15-20 günde bir kez uygulanır. Sebzeler ve meyveler için sulama sistemleri ile veya topraktan 2-4 L /da Kesme çiçek içinse 1-3 L /da dozunda uygulanabilir.			

Lisans No : 1489
Tescil No : 33743
Parti/Seri No : Ambalajın üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.
Son Kull. Tarihi : Üretim Tarihinden İtibaren 5 Yıldır.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI			
BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	SULAMA SUYU İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA (100 L SUDA)
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Fasulye, Kavun vb.	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Meyve Ağaçları	Vegatif gelişme dönemi boyunca 1-2 hafta ara ile	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Bağlar	Aktif gelişme döneminde	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Narenciye	Baharda sürgün gelişimi boyunca 10 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Fındık	Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	100 ml (122g) /Ocak	150-200 ml (183-244g)
Çilek	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca	2-2,5 L (2,44-3,05kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	Aktif gelişme döneminde ve başaklanma öncesi	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	150-200 ml (183-244g)
Pamuk	Aktif gelişme süresince ve çiçeklenme öncesi	2-3 L (2,44-3,66kg)/da	200-250 ml (244-305g)
Vegetatif gelişmenin yoğun olduğu dönemlerde 15-20 günde bir kez uygulanır. Sebzeler ve meyveler için sulama sistemleri ile veya topraktan 2-4 L /da Kesme çiçek içinse 1-3 L /da dozunda uygulanabilir.			

Lisans No : 1489
Tescil No : 33743
Parti/Seri No : Ambalajın üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.
Son Kull. Tarihi : Üretim Tarihinden İtibaren 5 Yıldır.