

EC FERTILIZER

QUATRO

11.52.8+ME

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik

: % (w/w)

Toplam Azot (N)	: 11
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: 8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: 3
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: 52
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: 52
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: 8
Suda Çözünür Bor (B)	: 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,005
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,02
Suda Çözünür Manganez (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: 0,008
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,04

EDTA Şelatın Stabil Olduğu pH Aralıkları (Cu, Fe, Mn, Zn) 4-9



EC FERTILIZER

QUATRO

11.52.8+ME

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik

: % (w/w)

Toplam Azot (N)	: 11
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: 8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: 3
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: 52
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: 52
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: 8
Suda Çözünür Bor (B)	: 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,005
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,02
Suda Çözünür Manganez (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: 0,008
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,04

EDTA Şelatın Stabil Olduğu pH Aralıkları (Cu, Fe, Mn, Zn) 4-9



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Algink Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURLA DAMLAMAYA (dekara)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFALİ, KAYISI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Surgüler 3-5 cm iken, sulam usulüne dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su kışımı dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, INCİR	Filletlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCEMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Karşılaşılma döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 ml - 1L
ŞEKER PANCARI, Tütün	Yumurto büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Karşılaşılma dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR

* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalarından uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, oksinin ispoti halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO
LİSANS NO
PARTİ NO
ÜRETİM TARİHİ

:2025T06462
: 029
:
:

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2/Kırm. Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemeada / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr