

EC FERTİLİZER

QUATRO

11.52.8+ME

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik :% (w/w)

Toplam Azot (N)	: 11
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: 8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: 3
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentoksit (P ₂ O ₅)	: 52
Suda Çözünür Fosfor Pentoksit (P ₂ O ₅)	: 52
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: 8
Suda Çözünür Bor (B)	: 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,005
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: 0,008
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı	: 0,04

EDTA Şelatın Stabil Olduğu pH Aralıkları (Cu, Fe, Mn, Zn) 4-9



RİSK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalarından uzak tutunuz. Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz. Gübreleme tozlarını teneffüs etmeyiniz. Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız. Gübreleme esnasında birşey yemeyiniz ve içmeyiniz. Maske, gözlük ve eldiven kullanınız. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

DİĞER KİMYASALLARLA KARİŞİBİLİRLİK

Asit reaksiyon gösterenler hariç diğer kimyasal gübrelerle ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Karıştırımdan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, +5 ile +35 °C sıcaklıkta saklanmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında ürünler ters çevrilmemelidir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisinin dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanun hükümlerinde belirtilen cezai işlemleri kabul ederiz.

KULLANMA TALİMATI

Ürün Adı	Kullanım Dönemi	Sulama Suyu ile Kullanım Dozu	Yapraktan Kullanım Dozu(100L Suda)
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Fasulye, Kavun vb.	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde artırılarak kullanılmaktadır	3-5 kg/da	150-200 g
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde artırılarak kullanılmaktadır	3-5 kg/da	150-200 g
Meyve Ağaçları	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 3-4 uygulamaya bölünerek	100-150 g/ağaç	150-200 g
Bağlar	Bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek, özellikle meyve çiçeklenme öncesi artırılarak kullanılmaktadır	3-5 kg/da	200-250 g
Zeytin	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası bölünerek 2-3 uygulama	100-150 g/ağaç	150-200 g
Narenciye	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası bölünerek 2-3 uygulama	150-200 g/ağaç	150-200 g
Fındık	Haziran dökümlerinden önce 15-20 gün arayla 2 uygulama	150 g/0cak	150-200 g
Çilek	Renk dönmeye başlamadan önce 7-10 gün arayla 3-4 uygulama	1,5-2 kg/da	150-200 g
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	Yumurru oluşmaya başlamadan önce bölünerek 2-3 uygulama	1,5-2 kg/da	200-250 g
Pamuk	Tarakanma başlangıcı ve çiçek öncesi	1,5-2 kg/da	150-200 g

ÜRETİCİ FİRMA

AGRO QUATRO
AGROQUATRO Organik Tarım San. Tic. A.Ş.

Eğilimsiz Mah. 6106/15 No:13 Bornova İzmir
Tel/Fax: +90 232 273 60 60
www.agroquatro.com • info@agroquatro.com
Lisans No : 1469
Tescil No : 21856
Parti/Seri No : Üretim Tarihi ile Aynıdır.
Son Kull. Tarihi : Üretim Tar. İtibaren 5 Yıldır.
Üretim Tarihi :

QUATRO 11.52.8+ME