



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Algink Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURCA DAMLAMAMA (dekara)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFTELİ, KAYISI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Surgüler 3-5 cm iken, salim uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su aşırma dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIKI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, INCİR	Filletlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BIBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERİÇMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 ml - 1L
ŞEKER PANCARI, TUTUN	Yumurı büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalarından uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığı gibi, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamızın sorumluluğu kabul etmez.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağına taahhüt eder, oksinin ispoti halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO : 2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2/Kırm. Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döğemada / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

RİSK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalarından uzak tutunuz. Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz. Gübreleme tozlarını tenefüs etmeyiniz. Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız. Gübreleme esnasında birşey yemeyiniz ve içmeyiniz. Maske, gözlük ve eldiven kullanınız. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

DiĞER KİMYASALLARLA KARİŞABİLİRLİK

Asit reaksiyon gösterenler hariç diğer kimyasal gübrelerle ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, **+5 ile +35 °C** sıcaklıkta saklanmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında ürünler ters çevrilmemelidir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız etiketin aynı olduğunu taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanun hükümlerinde belirtilen cezai işlemleri kabul ederiz

KULLANMA TALİMATI

Ürün Adı	Kullanım Dönemi	Sulama Suyu ile Kullanım Dozu	Yapraktan Kullanım Dozu(100L Suda)
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb.	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmaktadır	3-5 kg/da	150-200 g
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmaktadır	3-5 kg/da	150-200 g
Meyve Ağaçları	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 3-4 uygulamaya bölünerek	100-150 g /ağaç	150-200 g
Bağlar	Bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek, özellikle meyve çiçeklenme öncesi arttırılarak kullanılmaktadır	3-5 kg/da	200-250 g
Zeytin	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası bölünerek 2-3 uygulama	100-150 g /ağaç	150-200 g
Narenciye	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası bölünerek 2-3 uygulama	150-200 g /ağaç	150-200 g
Fındık	Haziran dökümlerinden önce 15-20 gün arayla 2 uygulama	150 g /Ocak	150-200 g
Çilek	Renk dönmeye başlamadan önce 7-10 gün arayla 3-4 uygulama	1,5-2 kg/g da	150-200 g
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	Yumurı oluşmaya başlamadan önce bölünerek 2-3 uygulama	1,5-2 kg/g da	200-250 g
Pamuk	Tarakanma başlangıcı ve çiçek öncesi	1,5-2 kg/g da	150-200 g

ÜRETİCİ FİRMA

AGRO QUATRO
AGROQUATRO Organik Tarım San. Tic. A.Ş.
Egemenlik Mah. 6106/15 No:13 Bornova İzmir
Tel/Fax: +90 232 273 60 60
www.agroquatro.com • info@agroquatro.com
Lisans No : 1489
Tescil No : 21856
Parti/Seri No : Üretim Tarihi ile Aynıdır.
Son Kull. Tarihi : Üretim Tar. İtibaren 5 Yıldır.
Üretim Tarihi :

QUATRO 11.52.8+ME

NET: 5 kg

RİSK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalarından uzak tutunuz. Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz. Gübreleme tozlarını tenefüs etmeyiniz. Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız. Gübreleme esnasında birşey yemeyiniz ve içmeyiniz. Maske, gözlük ve eldiven kullanınız. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

DiĞER KİMYASALLARLA KARİŞABİLİRLİK

Asit reaksiyon gösterenler hariç diğer kimyasal gübrelerle ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, **+5 ile +35 °C** sıcaklıkta saklanmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında ürünler ters çevrilmemelidir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız etiketin aynı olduğunu taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanun hükümlerinde belirtilen cezai işlemleri kabul ederiz

KULLANMA TALİMATI

Ürün Adı	Kullanım Dönemi	Sulama Suyu ile Kullanım Dozu	Yapraktan Kullanım Dozu(100L Suda)
Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb.	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmaktadır	3-5 kg/da	150-200 g
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzelerin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmaktadır	3-5 kg/da	150-200 g
Meyve Ağaçları	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 3-4 uygulamaya bölünerek	100-150 g /ağaç	150-200 g
Bağlar	Bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek, özellikle meyve çiçeklenme öncesi arttırılarak kullanılmaktadır	3-5 kg/da	200-250 g
Zeytin	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası bölünerek 2-3 uygulama	100-150 g /ağaç	150-200 g
Narenciye	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası bölünerek 2-3 uygulama	150-200 g /ağaç	150-200 g
Fındık	Haziran dökümlerinden önce 15-20 gün arayla 2 uygulama	150 g /Ocak	150-200 g
Çilek	Renk dönmeye başlamadan önce 7-10 gün arayla 3-4 uygulama	1,5-2 kg/g da	150-200 g
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	Yumurı oluşmaya başlamadan önce bölünerek 2-3 uygulama	1,5-2 kg/g da	200-250 g
Pamuk	Tarakanma başlangıcı ve çiçek öncesi	1,5-2 kg/g da	150-200 g

ÜRETİCİ FİRMA

AGRO QUATRO
AGROQUATRO Organik Tarım San. Tic. A.Ş.
Egemenlik Mah. 6106/15 No:13 Bornova İzmir
Tel/Fax: +90 232 273 60 60
www.agroquatro.com • info@agroquatro.com
Lisans No : 1489
Tescil No : 21856
Parti/Seri No : Üretim Tarihi ile Aynıdır.
Son Kull. Tarihi : Üretim Tar. İtibaren 5 Yıldır.
Üretim Tarihi :

QUATRO 11.52.8+ME

NET: 5 kg