



EC FERTİLİZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

TTMIX

12-0-6+(5 MgO)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	%(w/w)
Toplam Azot (N)	12
Nitrat Azotu ($\text{NO}_3\text{-N}$)	2
Üre Azotu ($\text{NH}_2\text{-N}$)	10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	6
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	5
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Demir (Fe)	4
Suda Çözünür Manganez (Mn)	4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	4

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



Net Ağırlık: 1 kg

TTMIX 12-0-6+(5 MgO)+ME

UYARILAR

- *Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 ile +45°C derece arasında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 5 yıl korur. Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

UYGULAMA DOZLARI, KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Narenciye	Filizlenme döneminde	150-200 g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik ve Nar	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Bağ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Antep Fıstığı, Fındık	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²
Zeytin	Meyve büyüme döneminde	100-150 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²
Muz	Parmak uzama dönemi	100-150 g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Kivi, Incir	Filizlenme döneminde	100-150 g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Domates, Biber	Çiçeklenme sonrasında itibaren	50-100 g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Hıyar, Patlıcan	Çiçeklenme sonrasında itibaren	50-100g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Kavun, Karpuz	Filizlenme döneminde	50-100 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²
Kesme Çiçekçilik	Fide dikiminden itibaren	50-100 g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Mercimek	İlk çıkıştan itibaren	70-100 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²
Yerfıstığı	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²
Parmak, Ayçiçeği, Mısır, Kanola vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²
Celtik	Kardeşlenme döneminde	100-150 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²
Çay	Her biçimden sonra	100-150 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²
Şeker Pancarı	İlk kıştan itibaren	100-150 g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Meyve Fidanları	Fidan gelişim döneminde	150-200g/100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
Hububat (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²
Yeşil Alanlar	Her biçimden sonra	200-300 g/da	0,5-1 kg/1000 m ²

"Not: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalar da belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mükürün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Buz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyacı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- *Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- *Kuvvetli Alkali (yüksek pH) ve Kuvvetli Asitlerle (düşük pH), Klor, Organik Fosfor, Alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- *Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- *Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız kullanımı sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz (eldiven ve gözlük takınız).
- *Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önemi almamış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- *Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçerek sorununuz.
- *Üretici firma veya bayi ile temas kurmadığınız durumlarda şeffaf bir kap içerisine 100 g su koyunuz içerisine ne 1 yada 2 g üründen koyup çözünüz, daha sonra karıştırmak istediğiniz malzemeden 1 yada 2 g ekleyiniz eğer çökme suda çözünmeyen maddelerin oluşumu kesilme, gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız, bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA



AGROQUATRO Organik Tarım San Tic. A.Ş.
Egemenlik Mah. 6106/15 Sk. No:13 Bornova İzmir
Tel/Fax: +90 232 273 60 60
www.agroquatro.com • info@agroquatro.com

Net Ağırlık: 1 kg



Lisans No : 1489
Tescil No : 2025TK13533
Parti/Seri No : Ambalajın Üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Son Kullanma Tarihi : Üretim Tarihinden İtibaren 5 Yıldır.