

CARBOŞ

SIVI KÜKÜRT
pH DÜŞÜRÜCÜ
Karboksilik Asit Kompleksi

Kullanım Dozu :
Topraktan 1-2 L /da

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Topraktaki tuzluluktan dolayı oluşan problemlerin önlenmesine yardımcı olur.
- Bitki ve toprağın kükürt eksikliğini giderir.
- Damlama açıcı olarak kullanılabilir.
- Küçük mikron çapından dolayı sulama sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.
- Verilen azotu; amonyum ve nitrat formları olarak dengeli bir şekilde bitkiye ulaşmasını sağlar.
- CARBOŞ'dan sonra uygulanan besin elementleri, bitkiye sorunsuz bir şekilde iletilir.
- Toprağın pH'ını düşürür. Toprakta bağlı kireci, alınabilir kalsiyuma dönüştürür.



Dikkat!
Tahris Edicidir.

UYARILAR :

- TAHRİŞ EDİCİDİR.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız.
- Sadece gerekli yerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Koruyucu maske ve eldiven kullanınız.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve temas halinde halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ :

NET : 20 L

ÜRETİCİ :
AVAZ
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AVAZ TARIM SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
FEVZİÇAKMAK MAH. 10515 SOK. NO:23/1
KARATAY/KONYA • TEL: 0332 342 19 74
www.avaztarim.com



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginek Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURCA DAMLAMA (dekara)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFALİ, KAYISI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Surgüler 3-5 cm iken, sulam usulüne dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su yapımı dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, INCİR	Filletlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 ml - 1L / da
ŞEKER PANCARI, KUTUN	Yumur bulama dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

- UYARILAR**
- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 - * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 - * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
 - * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
 - * Onerilen dozajı aşmayınız.
 - * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 - * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
 - * Kullanıktan sonra ambalajları imha ediniz.
 - * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- DEPOLAMA**
- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
 - * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 - * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, oksinin ispoti halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025TO6462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2/Kırm. Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemeada / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 – Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolucimtr – www.merkezanadolucimtr

