

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

BAC-FEED

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı :

Bacillus megaterium KBA-10, Pantoea agglomerans RK-134 ve Pseudomonas fluorescens FDG-37

Toplam canlı Mikroorganizma sayısı:

1×10^7 kob/gr

Organik Madde : % 6

Serbest Aminoasitler: % 0,2

pH: 7-9

***Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman olmadan kesinlikle kullanmayınız.**

***Teneffüs etmeyiniz.**



MİKROBİYAL ÜRÜNLER MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

BAC-FEED

UYARILAR

- Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman almadan kullanmayınız.
- Teneffüs etmeyiniz.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
- Göz ve deri temasından kaçınız.
- Ürünün paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız.
- Karşımı temiz bir tankta hazırlayıp ijiye karıştırınız ve bir gece beklettikten sonra kullanınız.
- Yüksek basınçla çalışan ilaçlama detleri ile uygulama yapmaktan kaçınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürünün, kullanıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direk güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir.
- Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C) ortalama 24 ay kadardır.
- Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır.
- Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır.
- Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15-20 gün muhafaza edilebilir.

KULLANILAN ORGANİZMALARIN YAŞAM SÜRESİ
Bacillus megaterium KBA-10, *Pantoea agglomerans* RK-134 ve *Pseudomonas fluorescens* FDG-37 bakteri izolatları özellikle topraktaki kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntı miktarı, nem oranı, organik madde miktarı ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak toprakta btki kök bölgesine kolonize olduktan sonra 18 ay canlı kalabilmektedir

FİRMA BEYANI

Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiketi üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece, ürünün teslim sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2022TO1996

LİSANS NO : 894

ÜRETİM TARİHİ:

PARTİ NO :

RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden

itibaren 24 ay

NET : 2 kg

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI

- **BAC-FEED**; *Bacillus megaterium* KBA-10, *Pantoea agglomerans* RK-134 ve *Pseudomonas fluorescens* FDG37 bakteri izolatlarını içeren, bir üründür.
- **BAC-FEED** içeriğinde bulunan *Bacillus megaterium* KBA-10, *Pantoea agglomerans* RK-134 ve *Pseudomonas fluorescens* FDG-37 bakteri izolatları sayesinde havanın serbest azotunu bitkilerin kullanabileceği nitrat ve amonyumu formuna dönüştürerek, topraktaki fosfatın yarıyışlığını artırarak, kalsiyumu çözerek, bitkilerde düzenli bir vejetatif gelişme ve etkisinin artmasına yardımcı olur.
- **BAC-FEED** uygulaması ile rekabet gücü yüksek olan *Bacillus megaterium* KBA-10, *Pantoea agglomerans* RK-134 ve *Pseudomonas fluorescens* FDG-37 bakteri izolatları bitkilerin kök bölgesine hızlı bir şekilde kolonize olarak topraktaki makro ve mikro besin elementlerinin bitki için etkisinin artmasına yardımcı olur.
- **BAC-FEED**, özellikle organik maddece fakir topraklarda uygulanacaksa organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse etkisinin artmasına yardımcı olur.
- **BAC-FEED** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, yoğun pestisit veya kimyasal gübre kalıntısı içermeyen uygun topraklarda yılda bir kez uygulanması yeterlidir ancak uygun olmayan toprak koşullarında 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanması ürünün etkisinin artmasına yardımcı olur.

KULLANIMDA TEKNİK BİLGİLER

Karşılabirlik:

Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak organik gübrelerle karıştırılarak etkinlik artırılabilir.

Dozaj ve kullanım şekli:

Seralarda : BAC-FEED dekara 1 kg olacak şekilde kullanılır. Temiz bir tankta 100 litre su içerisinde ijiye karıştırılarak düşük basınçlı pülverizatörle özellikle akşam saatlerinde toprak yüzeyine püskürtülerek yada damlama sulama ile bitkilerin direk kök bölgesine verilebilir.

Tarla bitkilerinde : BAC-FEED dekara 400 gr olacak şekilde kullanılır. Temiz bir tankta ijiye karıştırılarak üstten yeşil aksamı uygulama yapılır.

Ürünün Kullanımı için Uygun Toprak Şartları : BAC-FEED Ph'si 5,7-7,7 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çalışır. Özellikle tınlı olan bu topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşmış ve kısa sürede aktiveleri görülmeye başlamıştır. Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise BAC-FEED uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (aminoasitler gibi) ile kombine edilirse yada 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 22-32 °C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur.

Bitki çeşidine göre uygulama zamanı, uygulama miktarı ve uygulama sıklığı :

BAC-FEED; organik maddece zengin, nem oranı yüksek, daha önce yoğun pestisit ve kimyasal gübre uygulamaları yapılmamış alanlarda çelik, fide ve fidanların daldırılması veya toprağa spre edilmesi şeklinde uygulanacak ise bir kez uygulanması yeterlidir. Ancak; uygun olmayan toprak koşullarında sebzelerde bitkiler 10-15 cm büyüklüğüne ulaşınca, yeni tesis edilen meyve bahçelerindeki fidanlarda ise dikimden 10-15 gün sonra direk bitkilerin kök bölgesine verilecek ikinci ve ikinci uygulamadan 10-15 gün sonra üçüncü uygulama yapılabilir.

Tavsiye edilen ürünler ;

Çilek, sebzeler, meyve ağaçları, narenciye, bağ, süs bitkileri, kavun, karpuz, hububat ve yeşil alanlar.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, haklarımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA



CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AÖSB 3. Kısm Mh. 25. Cd. No:15 DÖŞEMEALTI ANTALYA
Tel : + 90 242 258 01 40 Fax: + 90 242 258 01 48