MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı: *Bacillus subtilis PA1 ve Paenibacillus azotofixans PA2*
Toplam Canlı Mikroorganizma Sayısı:
$1x10^7$ kob/gr

Organik Madde : % 10

Serbest Aminoasitler: % 0,2

pH: 5,5-7,5

MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

Clone

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı: *Bacillus subtilis PA1 ve Paenibacillus azotofixans PA2*
Toplam Canlı Mikroorganizma Sayısı:
$1x10^7$ kob/gr

Organik Madde : % 10

Serbest Aminoasitler: % 0,2

pH: 5,5-7,5

MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

Clone

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı: *Bacillus subtilis PA1 ve Paenibacillus azotofixans PA2*
Toplam Canlı Mikroorganizma Sayısı:
$1x10^7$ kob/gr

Organik Madde : % 10

Serbest Aminoasitler: % 0,2

pH: 5,5-7,5

MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

Clone

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

UYARILAR
• **Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman olmadan kesinlikle kullanmayınız.** • **Teneffüs etmeyiniz.** • Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. • Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz • Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. • Göz ve deri temasından kaçınınız. • Kullanırken maske,eldiven, ve gözlük kullanınız. • Ürünün paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız. • Karışımı temiz bir tankta hazırlayıp iyice karıştırınız ve bir gece bekletildikten sonra kullanınız. • Yüksek basınçla çalışan ilaçlama aletleri ile uygulama yapmaktan kaçınınız. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI- Spreybac; *Bacillus subtilis PA1 ve Paenibacillus azotofixans PA2* bakteri izolatlarını içeren doğal toz mikrobiyal bir ürünüdür. • **Spreybac;** uygulaması ile *Bacillus subtilis PA1* ve *Paenibacillus azotofixans PA2* bakteri izolatları bitkilerin kök ya da toprak üstü aksamına hızlı bir şekilde kolonize olarak topraktaki makro ve mikro besin elementlerinin bitki için yarayışlılığını artırarak bitki gelişimine yardımcı olur. • **Spreybac,** özellikle organik maddece fakir topraklarda uygulanacaksa organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse etkinlik daha da artırılabilir. • **Spreybac;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, yoğun pestisit veya kimyasal gübre kalıntısı içermeyen uygun topraklarda ylda bir kez uygulanması yeterlidir ancak uygun olmayan toprak koşullarında 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez uygulanması ürünün etkinliğini artırır **DEPOLAMA- Spreybac** kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direk güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. • Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C)ortalama **24 ay** kadardır. • Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. • Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. • Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15-20 gün muhafaza edilebilir **ÜRÜNÜN EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK ŞARTLARI:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir, özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görülmeye başlar.

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TO3367
LİSANS NO : 894
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 aydır

NET : 1 kg

Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 18-35 ° C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur.
KULLANIMDA TEKNİK BİLGİLERİ: Karışabilirlik: Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak organik gübrelerle karıştırılarak etkinlik artırılabilir.
Dozaj ve kullanım şekli:Seralarda: Spreybac 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletildikten sonra,düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde sprey edilerek uygulanır. **Tarla: Spreybac** 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletildikten sonra düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde sprey edilerek uygulanır. **Tarla bitkilerinde: Spreybac** dekara 50-75 gr olacak şekilde kullanılır. 100 lt su içerisinde iyice karıştırılarak direk güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletildikten sonra düşük basınçlı pülverizatörle özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde sprey edilerek uygulanır. **Ürünün kullanımı için uygun toprak şartları Spreybac:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir. Özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görülmeye başlar. Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler(amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez uygulanması ürünün etkinliğini artırır **DEPOLAMA- Spreybac** kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direk güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. • Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C)ortalama **24 ay** kadardır. • Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. • Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. • Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15-20 gün muhafaza edilebilir **ÜRÜNÜN EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK ŞARTLARI:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir, özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görülmeye başlar.

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TO3367
LİSANS NO : 894
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 aydır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
Clone
CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3. Kısım Mh. 25. Cd.
No:15 DÖŞEMEALTI ANTALYA
Tel : + 90 242 258 01 40 - Fax: + 90 242 258 01 48

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

UYARILAR
• **Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman olmadan kesinlikle kullanmayınız.** • **Teneffüs etmeyiniz.** • Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. • Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz • Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. • Göz ve deri temasından kaçınınız. • Kullanırken maske,eldiven, ve gözlük kullanınız. • Ürünün paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız. • Karışımı temiz bir tankta hazırlayıp iyice karıştırınız ve bir gece bekletildikten sonra kullanınız. • Yüksek basınçla çalışan ilaçlama aletleri ile uygulama yapmaktan kaçınınız. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI- Spreybac; *Bacillus subtilis PA1 ve Paenibacillus azotofixans PA2* bakteri izolatlarını içeren doğal toz mikrobiyal bir ürünüdür. • **Spreybac;** uygulaması ile *Bacillus subtilis PA1* ve *Paenibacillus azotofixans PA2* bakteri izolatları bitkilerin kök ya da toprak üstü aksamına hızlı bir şekilde kolonize olarak topraktaki makro ve mikro besin elementlerinin bitki için yarayışlılığını artırarak bitki gelişimine yardımcı olur. • **Spreybac,** özellikle organik maddece fakir topraklarda uygulanacaksa organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse etkinlik daha da artırılabilir. • **Spreybac;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, yoğun pestisit veya kimyasal gübre kalıntısı içermeyen uygun topraklarda ylda bir kez uygulanması yeterlidir ancak uygun olmayan toprak koşullarında 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez uygulanması ürünün etkinliğini artırır **DEPOLAMA- Spreybac** kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direk güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. • Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C)ortalama **24 ay** kadardır. • Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. • Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. • Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15-20 gün muhafaza edilebilir **ÜRÜNÜN EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK ŞARTLARI:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir, özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görülmeye başlar.

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TO3367
LİSANS NO : 894
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 aydır

NET : 1 kg

Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 18-35 ° C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur.
KULLANIMDA TEKNİK BİLGİLERİ: Karışabilirlik: Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak organik gübrelerle karıştırılarak etkinlik artırılabilir.
Dozaj ve kullanım şekli:Seralarda: Spreybac 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletildikten sonra,düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde sprey edilerek uygulanır. **Tarla: Spreybac** 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletildikten sonra düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde sprey edilerek uygulanır. **Tarla bitkilerinde: Spreybac** dekara 50-75 gr olacak şekilde kullanılır. 100 lt su içerisinde iyice karıştırılarak direk güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletildikten sonra düşük basınçlı pülverizatörle özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde sprey edilerek uygulanır. **Ürünün kullanımı için uygun toprak şartları Spreybac:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir. Özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görülmeye başlar. Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler(amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez uygulanması ürünün etkinliğini artırır **DEPOLAMA- Spreybac** kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direk güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. • Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C)ortalama **24 ay** kadardır. • Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. • Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. • Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15-20 gün muhafaza edilebilir **ÜRÜNÜN EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK ŞARTLARI:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir, özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görülmeye başlar.

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TO3367
LİSANS NO : 894
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 aydır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
Clone
CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3. Kısım Mh. 25. Cd.
No:15 DÖŞEMEALTI ANTALYA
Tel : + 90 242 258 01 40 - Fax: + 90 242 258 01 48

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

UYARILAR
• **Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman olmadan kesinlikle kullanmayınız.** • **Teneffüs etmeyiniz.** • Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. • Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz • Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. • Göz ve deri temasından kaçınınız. • Kullanırken maske,eldiven, ve gözlük kullanınız. • Ürünün paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız. • Karışımı temiz bir tankta hazırlayıp iyice karıştırınız ve bir gece bekletildikten sonra kullanınız. • Yüksek basınçla çalışan ilaçlama aletleri ile uygulama yapmaktan kaçınınız. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI- Spreybac; *Bacillus subtilis PA1 ve Paenibacillus azotofixans PA2* bakteri izolatlarını içeren doğal toz mikrobiyal bir ürünüdür. • **Spreybac;** uygulaması ile *Bacillus subtilis PA1* ve *Paenibacillus azotofixans PA2* bakteri izolatları bitkilerin kök ya da toprak üstü aksamına hızlı bir şekilde kolonize olarak topraktaki makro ve mikro besin elementlerinin bitki için yarayışlılığını artırarak bitki gelişimine yardımcı olur. • **Spreybac,** özellikle organik maddece fakir topraklarda uygulanacaksa organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse etkinlik daha da artırılabilir. • **Spreybac;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, yoğun pestisit veya kimyasal gübre kalıntısı içermeyen uygun topraklarda ylda bir kez uygulanması yeterlidir ancak uygun olmayan toprak koşullarında 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez uygulanması ürünün etkinliğini artırır **DEPOLAMA- Spreybac** kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direk güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. • Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C)ortalama **24 ay** kadardır. • Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. • Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. • Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15-20 gün muhafaza edilebilir **ÜRÜNÜN EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK ŞARTLARI:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir, özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görülmeye başlar.

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TO3367
LİSANS NO : 894
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 aydır

NET : 1 kg

Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 18-35 ° C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur.
KULLANIMDA TEKNİK BİLGİLERİ: Karışabilirlik: Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak organik gübrelerle karıştırılarak etkinlik artırılabilir.
Dozaj ve kullanım şekli:Seralarda: Spreybac 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletildikten sonra,düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde sprey edilerek uygulanır. **Tarla: Spreybac** 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletildikten sonra düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde sprey edilerek uygulanır. **Tarla bitkilerinde: Spreybac** dekara 50-75 gr olacak şekilde kullanılır. 100 lt su içerisinde iyice karıştırılarak direk güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletildikten sonra düşük basınçlı pülverizatörle özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde sprey edilerek uygulanır. **Ürünün kullanımı için uygun toprak şartları Spreybac:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir. Özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görülmeye başlar. Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler(amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez uygulanması ürünün etkinliğini artırır **DEPOLAMA- Spreybac** kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direk güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. • Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C)ortalama **24 ay** kadardır. • Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. • Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. • Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15-20 gün muhafaza edilebilir **ÜRÜNÜN EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK ŞARTLARI:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir, özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görülmeye başlar.

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TO3367
LİSANS NO : 894
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 aydır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
Clone
CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3. Kısım Mh. 25. Cd.
No:15 DÖŞEMEALTI ANTALYA
Tel : + 90 242 258 01 40 - Fax: + 90 242 258 01 48