

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı: *Bacillus subtilis PA1*
ve *Paenibacillus azotofixans PA2*
Toplam Canlı Mikroorganizma Sayısı:
1x10⁷ kob/gr

Organik Madde : % 10

Serbest Aminoasitler: % 0,2

pH: 5,5-7,5



MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU EKİPMAN
OLMADAN KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. TENEFFÜS ETMEYİNİZ.



MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

UYARILAR

• **Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman olmadan kesinlikle kullanmayınız. Teneffüs etmeyiniz.** Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
• Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz. • Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. • Göz ve deri temasından kaçınız. Kullanırken maske,eldiven, ve gözlük kullanınız. • Ürünün paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız. • Karşını temiz bir tankta hazırlayıp iyice karıştırınız ve bir gece bekletdikten sonra kullanınız. • Yüksek başlangıç çalışan ilaçlama aletleri ile uygulama yapmaktan kaçınız. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI: Spreybac; *Bacillus subtilis PA1* ve *Paenibacillus azotofixans PA2* bakterisi izolatlarını içeren doğal toz mikrobiyal bir üründür. • **Spreybac;** uygulaması ile *Bacillus subtilis PA1* ve *Paenibacillus azotofixans PA2* bakterisi izolatları bitkilerin kök ya da toprak üstü oksamına hızlı bir şekilde kolonize olarak topraktaki makro ve mikro besin elementlerinin bitki için yavaşlığını artırarak bitki gelişimine yardımcı olur. • **Spreybac,** özellikle organik maddece fakir topraklarda uygulanacaksa organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse etkinlik daha da artırılabilir. • **Spreybac;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, yoğun pestisit veya kimyasal gübre kalıntısı içermeyen uygun topraklarda yılda bir kez uygulanması yeterlidir ancak uygun olmayan toprak koşullarında 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez uygulanması ürünün etkinliğini artırır. **DEPOLAMA: Spreybac** kullanılmaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direk güneş ışına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. • Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C)ortalama **24 ay** kadardır. • Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. • Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. • Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapayı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15-20 gün muhafaza edilebilir. **ÜRÜNÜN EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK ŞARTLARI:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir, özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görölmeğe başlar.

TESCİL NO : 2023TO3367
LİSANS NO : 894
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 ay

NET : 2 kg

Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 18-35 ° C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur. **KULLANIMDA TEKNİK BİLGİLERİ: Karşılabilirlik:** Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak organik gübrelerle karıştırılarak etkinlik artırılabilir.

Dozaj ve kullanım şekli:Seralarda: Spreybac 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletdikten sonra düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde spray edilerek uygulanır. **Tarlada: Spreybac** 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletdikten sonra düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde spray edilerek uygulanır. **Ürünün kullanımı için uygun toprak şartları Spreybac:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir. Özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görölmeğe başlar. Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 18-35 ° C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur. **Bitki çeşidine göre uygulama zamanı, uygulama miktarı ve uygulama sıklığı: Spreybac;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, daha önce yoğun pestisit ve kimyasal gübre uygulaması yapılmamış alanlarda çekik, fide ya da fidanların dolanılması veya toprağa spray edilmesi şeklinde uygulanacak ise bir kez uygulanması yeterlidir. Ancak uygun olmayan toprak koşullarında sebzelerde bitkiler 10-15 cm büyüklüğüne ulaşınca, yeni tesis edilen meyve bahçelerindeki fidanlarda ise dikimden 10-15 gün sonra direk bitkilerin kök bölgesine verlersek ikinci veya üçüncü uygulamadan 10-15 gün sonra üçüncü uygulama yapılabilir. **Tavsiye edildiği ürünler:**Pamuk, süs bitkileri, hububat, meyve fidanları, meralar ve çim sahaları. **KULLANILAN ORGANİZMALARIN YAŞAM SÜRESİ:***Bacillus subtilis PA1* ve *Paenibacillus azotofixans PA2* bakterisi izolatları özellikle topraktaki kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntı miktarı, nem oranı, organik madde miktarı ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak topraktaki bitki kök bölgesine kolonize olduktan sonra 18 ay canlı kalabilmektedir.

FİRMA BEYAN Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanılması ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiketi üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece, ürünün, teslim sırasında, firma garantisidir.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezal işlemi, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA



CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3, Kiam Mh. 25. Cd.
No:15 DOĞUMEALTI ANTALYA
Tel. : + 90 242 258 01 40 - Fax : + 90 242 258 01 48

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı: *Bacillus subtilis PA1*
ve *Paenibacillus azotofixans PA2*
Toplam Canlı Mikroorganizma Sayısı:
1x10⁷ kob/gr

Organik Madde : % 10

Serbest Aminoasitler: % 0,2

pH: 5,5-7,5



MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU EKİPMAN
OLMADAN KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. TENEFFÜS ETMEYİNİZ.



UYARILAR

• **Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman olmadan kesinlikle kullanmayınız. Teneffüs etmeyiniz.** Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
• Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz. • Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. • Göz ve deri temasından kaçınız. Kullanırken maske,eldiven, ve gözlük kullanınız. • Ürünün paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız. • Karşını temiz bir tankta hazırlayıp iyice karıştırınız ve bir gece bekletdikten sonra kullanınız. • Yüksek başlangıç çalışan ilaçlama aletleri ile uygulama yapmaktan kaçınız. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI: Spreybac; *Bacillus subtilis PA1* ve *Paenibacillus azotofixans PA2* bakterisi izolatlarını içeren doğal toz mikrobiyal bir üründür. • **Spreybac;** uygulaması ile *Bacillus subtilis PA1* ve *Paenibacillus azotofixans PA2* bakterisi izolatları bitkilerin kök ya da toprak üstü oksamına hızlı bir şekilde kolonize olarak topraktaki makro ve mikro besin elementlerinin bitki için yavaşlığını artırarak bitki gelişimine yardımcı olur. • **Spreybac,** özellikle organik maddece fakir topraklarda uygulanacaksa organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse etkinlik daha da artırılabilir. • **Spreybac;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, yoğun pestisit veya kimyasal gübre kalıntısı içermeyen uygun topraklarda yılda bir kez uygulanması yeterlidir ancak uygun olmayan toprak koşullarında 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez uygulanması ürünün etkinliğini artırır. **DEPOLAMA: Spreybac** kullanılmaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direk güneş ışına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. • Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C)ortalama **24 ay** kadardır. • Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. • Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. • Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapayı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15-20 gün muhafaza edilebilir. **ÜRÜNÜN EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK ŞARTLARI:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir, özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görölmeğe başlar.

TESCİL NO : 2023TO3367
LİSANS NO : 894
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 ay

NET : 2 kg

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

SPREYBAC

Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 18-35 ° C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur. **KULLANIMDA TEKNİK BİLGİLERİ: Karşılabilirlik:** Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak organik gübrelerle karıştırılarak etkinlik artırılabilir.

Dozaj ve kullanım şekli:Seralarda: Spreybac 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletdikten sonra düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde spray edilerek uygulanır. **Tarlada: Spreybac** 100 litre kuyu suyuna 100-150 gr olacak şekilde ilave edilir ve iyice karıştırılarak direk güneş ışına maruz bırakmadan gölgede bir gece bekletdikten sonra düşük basınçlı pülverizatör ile özellikle akşam saatlerinde bitkinin tüm yüzeyi iyice ıslanacak şekilde spray edilerek uygulanır. **Ürünün kullanımı için uygun toprak şartları Spreybac:** pH'sı 5,9-7,9 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çok iyi sonuç verir. Özellikle tınlı topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve aktive kısa sürede görölmeğe başlar. Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3-4 gün sonra ise **Spreybac** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 18-35 ° C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur. **Bitki çeşidine göre uygulama zamanı, uygulama miktarı ve uygulama sıklığı: Spreybac;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, daha önce yoğun pestisit ve kimyasal gübre uygulaması yapılmamış alanlarda çekik, fide ya da fidanların dolanılması veya toprağa spray edilmesi şeklinde uygulanacak ise bir kez uygulanması yeterlidir. Ancak uygun olmayan toprak koşullarında sebzelerde bitkiler 10-15 cm büyüklüğüne ulaşınca, yeni tesis edilen meyve bahçelerindeki fidanlarda ise dikimden 10-15 gün sonra direk bitkilerin kök bölgesine verlersek ikinci veya üçüncü uygulamadan 10-15 gün sonra üçüncü uygulama yapılabilir. **Tavsiye edildiği ürünler:**Pamuk, süs bitkileri, hububat, meyve fidanları, meralar ve çim sahaları. **KULLANILAN ORGANİZMALARIN YAŞAM SÜRESİ:***Bacillus subtilis PA1* ve *Paenibacillus azotofixans PA2* bakterisi izolatları özellikle topraktaki kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntı miktarı, nem oranı, organik madde miktarı ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak topraktaki bitki kök bölgesine kolonize olduktan sonra 18 ay canlı kalabilmektedir.

FİRMA BEYAN Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanılması ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiketi üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece, ürünün, teslim sırasında, firma garantisidir.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezal işlemi, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA



CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3, Kiam Mh. 25. Cd.
No:15 DOĞUMEALTI ANTALYA
Tel. : + 90 242 258 01 40 - Fax : + 90 242 258 01 48