

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'lı Katı Organomineral Gübre

algicold

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 4
Organik Azot (N)	% 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 2
Serbest Aminoasitler	% 7
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 12
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'lı Katı Organomineral Gübre

algicold

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 4
Organik Azot (N)	% 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 2
Serbest Aminoasitler	% 7
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 12
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'lı Katı Organomineral Gübre

algicold

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURCA DAMLAMA (dekara)
NARENÇİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve bağlama öncesi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEPTALİ, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve BAĞ	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sürgünler 3-5 cm iken, salım uzama öncesi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su jütüne öncesi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yoz öncesi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, INCİR	Filidenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bittinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-400 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bittinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bittinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim öncesi boyunca	50-100 g	250-400 g / da
MERİCMEK, NOHUT	Çiçeklenme bağlanca minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
CELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SEKER PANCAR, Tütün	Yumurı büyüme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme öncesi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

NET : 1 kg

TESCİL NO
LİSANS NO
PARTİ NO
ÜRETİM TARİHİ

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FIRMA
merkez
ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kam Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYARILAR

* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozaı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen saklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

: 2026T07208
: 029
:
:
:

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'lı Katı Organomineral Gübre

algicold

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 4
Organik Azot (N)	% 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 2
Serbest Aminoasitler	% 7
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 12
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'lı Katı Organomineral Gübre

algicold

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURCA DAMLAMA (dekara)
NARENÇİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve bağlama öncesi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEPTALİ, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve BAĞ	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sürgünler 3-5 cm iken, salım uzama öncesi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su jütüne öncesi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FİSTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yoz öncesi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, INCİR	Filidenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bittinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-400 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bittinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bittinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim öncesi boyunca	50-100 g	250-400 g / da
MERİCMEK, NOHUT	Çiçeklenme bağlanca minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
CELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SEKER PANCAR, Tütün	Yumurı büyüme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme bağlanca, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme öncesi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

NET : 1 kg

TESCİL NO
LİSANS NO
PARTİ NO
ÜRETİM TARİHİ

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FIRMA
merkez
ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kam Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr