

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımaza tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirlen saçaklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amac dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025T06462

LİSANS NO : 029

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 1 kg

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ		UYGULAMA DOZU	
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN (100 L su / da)	DAMLAMLA (dakika)
NARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFALİ, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve BAĞ	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Bargörler 3-5 cm iken, salımlı uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve in koruk, tatl su yitirme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FİSTİĞİ FİNGİR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 11. yıl dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Buğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Fildişleme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Birinci 11. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HYAR, PATLICAN	Birinci 11. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Birinci 11. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERİÇMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFESTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MEİR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
CELTİK	Karadışırma döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SERBER PANCAR, DUTUN	Yumurta büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Karadışırma dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımaza tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirlen saçaklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amac dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025T06462

LİSANS NO : 029

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 1 kg

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ		UYGULAMA DOZU	
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN (100 L su / da)	DAMLAMLA (dakika)
NARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFALİ, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve BAĞ	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Bargörler 3-5 cm iken, salımlı uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve in koruk, tatl su yitirme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FİSTİĞİ FİNGİR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 11. yıl dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Buğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Fildişleme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Birinci 11. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HYAR, PATLICAN	Birinci 11. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Birinci 11. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERİÇMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFESTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MEİR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
CELTİK	Karadışırma döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SERBER PANCAR, DUTUN	Yumurta büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Karadışırma dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımaza tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirlen saçaklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amac dışı kullanımı ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025T06462

LİSANS NO : 029

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 1 kg

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ		UYGULAMA DOZU	
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN (100 L su / da)	DAMLAMLA (dakika)
NARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFALİ, KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve BAĞ	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Bargörler 3-5 cm iken, salımlı uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve in koruk, tatl su yitirme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FİSTİĞİ FİNGİR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 11. yıl dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Buğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Fildişleme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Birinci 11. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HYAR, PATLICAN	Birinci 11. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Birinci 11. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERİÇMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFESTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MEİR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
CELTİK	Karadışırma döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SERBER PANCAR, DUTUN	Yumurta büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Karadışırma dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr