

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA (da /100 L su)	DAMLAMADAN UYGULAMA (Dekara)
SEBZELER Domates, Biber, patlıcan ,fasulye, bezelye Patates, soğan, sarımsak, hıyar, Kavun, karpuz kabak vb. (Her türlü açık ve kapalı olan Sebze yetiştiriciliğinde)	-Bitkinin ilk dönemlerinde' (2. çiçeğe kadar)	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
	-2. çiçekten hasada kadar (2-3 uygulama)	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
MEYVE AĞAÇLARI Yumuşak ve taş çekirdekli meyvelerde, Kiraz, şeftali, kayısı, erik, vişne, elma, armut, badem, fındık, nar vb	-Çiçeklenme başlangıcı, meyve Bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
BAĞCILIK Sofralık ve kuru üzümde Çekirdekli ve Sultaniye her çeşit için	-Sürgünler 3-5 cm lken, Salıkım uzama dönemi, Çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su yürüme döneminde	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
ÇİLEK	Sezon Boyunca	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
PAMUK	-6-8 yapraklı dönemden hasada kadar	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
FİDANCILIK VE ÇİÇEKÇİLİKTE	-Gelişim dönemi boyunca	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
MARUL, MAYDANOZ, TERE, ROKA vb. (Yeşil Tüketim Bitkileri)	-Gelişim dönemi boyunca	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
ZEYTİN	-Çiçeklenme başlangıcı, meyve Bağlama ve renk dönemine kadar ki, yaz dönemi boyunca.	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
NARENCİYE	-Çiçeklenme dönemi, meyve Bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar.	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
TÜTÜN	-Fidelik Döneminde, Dikimden kırım dönemine kadar 3 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
SANAYİ BİTKİLERİ Şeker Pancarı, Anason, Misir, Ayçiçeği vb.	-Erken Gelişme döneminde minimum 2 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
NOHUT	-Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Sıvı Deniz Yosunu

algae power plus

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginiik Asit
Maksimum EC (dS/m)
pH Aralığı

%(w/w)

%10
% 4
% 0,5
5
(6,1-8,1)

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADELER BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER



merkez
ANADOLU KİMYA

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında,depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 13569

LİSANS NO : 029

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA (da /100 L su)	DAMLAMADAN UYGULAMA (Dekara)
SEBZELER Domates, Biber, patlıcan ,fasulye, bezelye Patates, soğan, sarımsak, hıyar, Kavun, karpuz kabak vb. (Her türlü açık ve kapalı olan Sebze yetiştiriciliğinde)	-Bitkinin ilk dönemlerinde' (2. çiçeğe kadar)	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
	-2. çiçekten hasada kadar (2-3 uygulama)	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
MEYVE AĞAÇLARI Yumuşak ve taş çekirdekli meyvelerde, Kiraz, şeftali, kayısı, erik, vişne, elma, armut, badem, fındık, nar vb	-Çiçeklenme başlangıcı, meyve Bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
BAĞCILIK Sofralık ve kuru üzümde Çekirdekli ve Sultaniye her çeşit için	-Sürgünler 3-5 cm lken, Salıkım uzama dönemi, Çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su yürüme döneminde	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
ÇİLEK	Sezon Boyunca	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
PAMUK	-6-8 yapraklı dönemden hasada kadar	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
FİDANCILIK VE ÇİÇEKÇİLİKTE	-Gelişim dönemi boyunca	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
MARUL, MAYDANOZ, TERE, ROKA vb. (Yeşil Tüketim Bitkileri)	-Gelişim dönemi boyunca	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
ZEYTİN	-Çiçeklenme başlangıcı, meyve Bağlama ve renk dönemine kadar ki, yaz dönemi boyunca.	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
NARENCİYE	-Çiçeklenme dönemi, meyve Bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar.	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
TÜTÜN	-Fidelik Döneminde, Dikimden kırım dönemine kadar 3 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
SANAYİ BİTKİLERİ Şeker Pancarı, Anason, Misir, Ayçiçeği vb.	-Erken Gelişme döneminde minimum 2 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
NOHUT	-Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Sıvı Deniz Yosunu

algae power plus

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginiik Asit
Maksimum EC (dS/m)
pH Aralığı

%(w/w)

%10
% 4
% 0,5
5
(6,1-8,1)

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADELER BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER



merkez
ANADOLU KİMYA

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında,depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 13569

LİSANS NO : 029

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ			
ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA (da /100 L su)	DAMLAMADAN UYGULAMA (Dekara)
SEBZELER Domates, Biber, patlıcan ,fasulye, bezelye Patates, soğan, sarımsak, hıyar, Kavun, karpuz kabak vb. (Her türlü açık ve kapalı olan Sebze yetiştiriciliğinde)	-Bitkinin ilk dönemlerinde' (2. çiçeğe kadar)	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
	-2. çiçekten hasada kadar (2-3 uygulama)	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
MEYVE AĞAÇLARI Yumuşak ve taş çekirdekli meyvelerde, Kiraz, şeftali, kayısı, erik, vişne, elma, armut, badem, fındık, nar vb	-Çiçeklenme başlangıcı, meyve Bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
BAĞCILIK Sofralık ve kuru üzümde Çekirdekli ve Sultaniye her çeşit için	-Sürgünler 3-5 cm lken, Salıkım uzama dönemi, Çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su yürüme döneminde	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
ÇİLEK	Sezon Boyunca	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
PAMUK	-6-8 yapraklı dönemden hasada kadar	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
FİDANCILIK VE ÇİÇEKÇİLİKTE	-Gelişim dönemi boyunca	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
MARUL, MAYDANOZ, TERE, ROKA vb. (Yeşil Tüketim Bitkileri)	-Gelişim dönemi boyunca	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
ZEYTİN	-Çiçeklenme başlangıcı, meyve Bağlama ve renk dönemine kadar ki, yaz dönemi boyunca.	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
NARENCİYE	-Çiçeklenme dönemi, meyve Bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar.	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
TÜTÜN	-Fidelik Döneminde, Dikimden kırım dönemine kadar 3 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
SANAYİ BİTKİLERİ Şeker Pancarı, Anason, Misir, Ayçiçeği vb.	-Erken Gelişme döneminde minimum 2 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L
NOHUT	-Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	150 – 200 mL	500 mL / 1 L

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Sıvı Deniz Yosunu

algae power plus

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginiik Asit
Maksimum EC (dS/m)
pH Aralığı

%(w/w)

%10
% 4
% 0,5
5
(6,1-8,1)

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADELER BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER



merkez
ANADOLU KİMYA

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında,depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 13569

LİSANS NO : 029

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.

A.O.S.B. 2.Kisim Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr