

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Sıvı Deniz Yosunu

algae power

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginik Asit
Maksimum EC (dS/m)
pH Aralığı

(w/w)

% 5
% 2
% 0,3
6
(8,8-10,8)

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADELER
BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Sıvı Deniz Yosunu

algae power

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginik Asit
Maksimum EC (dS/m)
pH Aralığı

(w/w)

% 5
% 2
% 0,3
6
(8,8-10,8)

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADELER
BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Amongum Azotu (NH₄-N)
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginik Asit
Serbest Aminoasitler
Maksimum Nem
Maksimum Klor (Cl)
pH

(w/w)

% 35
% 6
% 3
% 3
% 9
% 1
% 9
% 20
% 6,5
(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Amongum Azotu (NH₄-N)
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginik Asit
Serbest Aminoasitler
Maksimum Nem
Maksimum Klor (Cl)
pH

(w/w)

% 35
% 6
% 3
% 3
% 9
% 1
% 9
% 20
% 6,5
(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYARLAR
* Dikot çöceklerden, evcil hayvanlardan ve güdülerden uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.

* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.

* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sacıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanım, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

UYGULAMA DOZLARI KULLANIM DÖNEMLERİ		UYGULAMA DOZU	
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN (100 L su / da)	DAHLAMA (akıntı)
BARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
SEFİTLİ KAYI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sarıgöller 35 cm iken, salıken uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ila ve il sonuna, tohum suyu dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTER PESTİL, FENKİ	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
ZELTİN	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 10 gün ara ile 2 uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Başlangıç öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVIL, INCİR	Başlangıç öncesi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bikinin II. dönemlerinde (2. çiçek kodu)	50-80 g	200-400 g / da
AYRAN, PATLICAN	Bikinin II. dönemlerinde (2. çiçek kodu)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bikinin II. dönemlerinde (2. çiçek kodu)	50-80 g	200-400 g / da
KİSİM ÇİÇEKÇİLİK	Salkım gelişim dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
MERİMEK, NOHUT	Çiçeklenme bağlama minimum 2 uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
PANKAR, AYÇİÇEĞİ, NERİ, KANOLA vb.	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
YERFESTİĞİ	Erken gelişim dönemine minimum 2 uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
CELTİK	Karadikenin dönemlerinde 10 gün ara ile 2 uygulamaya	50-100 g	-
KAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
BEKİR PANCAR, ZİTİN	Yarın bağlama dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
KURUBAT	Karadikenin dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

TESTÇİ NO : 2025T06462

LİSANS NO : 029

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.

A.Ö.S.B. 2. Kısım Mahallesi 24. Caddesi No:2 Döşemealtı / ANTALYA

Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48

info@merkezanadolukimya.com.tr - www.merkezanadolukimya.com.tr

NET: 400 gr

merkez
ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.

A.Ö.S.B. 2. Kısım Mahallesi 24. Caddesi No:2 Döşemealtı / ANTALYA

Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48

info@merkezanadolukimya.com.tr - www.merkezanadolukimya.com.tr

UYGULAMA DOZLARI KULLANIM DÖNEMLERİ		UYGULAMA DOZU	
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN (100 L su / da)	DAHLAMA (akıntı)
BARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
SEFİTLİ KAYI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sarıgöller 35 cm iken, salıken uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ila ve il sonuna, tohum suyu dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTER PESTİL, FENKİ	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
ZELTİN	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 10 gün ara ile 2 uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Başlangıç öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVIL, INCİR	Başlangıç öncesi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bikinin II. dönemlerinde (2. çiçek kodu)	50-80 g	200-400 g / da
AYRAN, PATLICAN	Bikinin II. dönemlerinde (2. çiçek kodu)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bikinin II. dönemlerinde (2. çiçek kodu)	50-80 g	200-400 g / da
KİSİM ÇİÇEKÇİLİK	Salkım gelişim dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
MERİMEK, NOHUT	Çiçeklenme bağlama minimum 2 uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
PANKAR, AYÇİÇEĞİ, NERİ, KANOLA vb.	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
YERFESTİĞİ	Erken gelişim dönemine minimum 2 uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
CELTİK	Karadikenin dönemlerinde 10 gün ara ile 2 uygulamaya	50-100 g	-
KAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
BEKİR PANCAR, ZİTİN	Yarın bağlama dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g / da
KURUBAT	Karadikenin dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da