

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Sera Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Açık Tarla Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Elma, Armut , Ayva	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Üzüm, Muz, Nar, Incir	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tütün	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar, Çeltik	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da



ÜRETİCİ FIRMA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER

Kalsiyum Klorür Çözeltisi

anatolia
Ca-Bor

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (B)

(w/w)

% 12
% 0,2

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI A MAYINIZ!
SADECE GEREKL YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO :2023TK8416

LİSANS NO :199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Sera Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Açık Tarla Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Elma, Armut , Ayva	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Üzüm, Muz, Nar, Incir	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tütün	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar, Çeltik	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da



ÜRETİCİ FIRMA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER

Kalsiyum Klorür Çözeltisi

anatolia
Ca-Bor

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (B)

(w/w)

% 12
% 0,2

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI A MAYINIZ!
SADECE GEREKL YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO :2023TK8416

LİSANS NO :199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Sera Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Açık Tarla Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Elma, Armut , Ayva	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Üzüm, Muz, Nar, Incir	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tütün	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar, Çeltik	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da



ÜRETİCİ FIRMA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER

Kalsiyum Klorür Çözeltisi

anatolia
Ca-Bor

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (B)

(w/w)

% 12
% 0,2

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI A MAYINIZ!
SADECE GEREKL YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO :2023TK8416

LİSANS NO :199

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır