

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
SERA SEBZELERİNDE	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
AÇIK TARLA SEBZELERİNDE	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ, ÇİLEK	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT, AYVA	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KIRAZ, VIŞNE, KAYISI, NEKTARİN, ERIK	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
ÜZÜM, MUZ, NAR, İNCİR	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
NARENCİYE, ZEYTİN, ÇAY	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI, KESTANE	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
PAMUK, MISIR, AYÇİÇEĞİ, SOYA, KANOLA, TÜTÜN	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminde hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
LAHANA, TURP, HAVUÇ, KEREVİZ, KARNABAHAİR	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminde hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
TAHILLAR, BAKLAGILLER, YEM BİTKİLERİ	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminde hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI, PATATES, SOĞAN, SARIMSAK	Yumurı oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK, YEŞİL ALANLAR, ÇELTİK	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemedi / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER
Kalsiyum Klorür Çözeltisi

anatolia
Ca-Bor

UYARILAR

- * Dikkat
- * Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.

* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi

TESCİL NO : 2023TK8416
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET : 20 L

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginek Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
SERA SEBZELERİNDE	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
AÇIK TARLA SEBZELERİNDE	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ, ÇİLEK	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT, AYVA	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KIRAZ, VIŞNE, KAYISI, NEKTARİN, ERIK	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
ÜZÜM, MUZ, NAR, İNCİR	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
NARENCİYE, ZEYTİN, ÇAY	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI, KESTANE	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
PAMUK, MISIR, AYÇİÇEĞİ, SOYA, KANOLA, TÜTÜN	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminde hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
LAHANA, TURP, HAVUÇ, KEREVİZ, KARNABAHAİR	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminde hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
TAHILLAR, BAKLAGILLER, YEM BİTKİLERİ	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminde hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI, PATATES, SOĞAN, SARIMSAK	Yumurı oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK, YEŞİL ALANLAR, ÇELTİK	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 ml / 100 L su	1-3 L / da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde.
No:2 Döşemedi / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER
Kalsiyum Klorür Çözeltisi

anatolia
Ca-Bor

UYARILAR

- * Dikkat
- * Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.

* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi

TESCİL NO : 2023TK8416
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET : 20 L

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YERİNE DÜŞÜRÜLME (dekara)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Surgunlar 3-5 cm iken, südem uzaına dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su aşırımsa dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Filletlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 ml - 1L / da
ŞEKER PANCARI, TUTUN	Yumurı büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemedi / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr