

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
BAĞ	Tane irime dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Gelişme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ZEYTİN	Tane büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MUZ	Parmak dolum dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KIVI, INCİR	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
DOMATES, BIBER	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HIYAR, PATLICAN	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KAVUN, KARPUZ	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kesimden önce	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YERFISTIĞI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇELTİK	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HUBUBAT	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakтан uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000m² için yaprakтан uygulanır.

Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

TESCİL NO : 20959
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tet. 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER
Magnezyum Nitrat Çözeltisi

anatolia Mg



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Algirik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURLA DAMLAMAMA (dekara)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Surgunlar 3-5 cm ile, süzüm uzaına dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su kışımı dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, INCİR	Filletlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BIBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçge kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçge kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçge kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 ml. - 1L / da
ŞEKER PANCARI, YITUNE	Yumru büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

- UYARILAR**
- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 - * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 - * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
 - * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
 - * Önerilen dozajı aşmayınız.
 - * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
 - * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
 - * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
 - * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- DEPOLAMA**
- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
 - * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
 - * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tet. 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Meyve büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
BAĞ	Tane irime dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Gelişme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ZEYTİN	Tane büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MUZ	Parmak dolum dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KIVI, INCİR	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
DOMATES, BIBER	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HIYAR, PATLICAN	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KAVUN, KARPUZ	Gelişme dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kesimden önce	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YERFISTIĞI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇELTİK	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ÇAY	Her biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
HUBUBAT	Kardeşlenmeden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	200 cc / 100 lt	1-2 lt / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakтан uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000m² için yaprakтан uygulanır.

Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

TESCİL NO : 20959
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tet. 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr