EC FERTILIZER
Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

bormazin

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
BAĞ	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
MUZ	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
PATATES	Çiçeklenme öncesi	200-250 g / da	2-3 kg /1000m²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi	70-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 40-50 cm iken	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ÇAY	Filizlenme dönemi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ŞEKER PANCARI	Yumru oluşum dönemi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
MEYVE FİDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 1-2 defa	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemde	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

UYARILAR
* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz,yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
*Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
* Ürün kendi orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur. * Bu nedenle, ürünü kendi orjinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı,firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2021TK698
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 2,5 kg

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH_4-N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

merkez ANADOLU KİMYA

EC FERTILIZER
Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

bormazin

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
BAĞ	Çiçeklenme öncesi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
MUZ	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
PATATES	Çiçeklenme öncesi	200-250 g / da	2-3 kg /1000m²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi	70-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 40-50 cm iken	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ÇAY	Filizlenme dönemi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
ŞEKER PANCARI	Yumru oluşum dönemi	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
MEYVE FİDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 1-2 defa	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemde	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	0,5-1 kg / 1000m²

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

UYARILAR
* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz,yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
*Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
* Ürün kendi orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur. * Bu nedenle, ürünü kendi orjinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı,firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO : 2021TK698
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 2,5 kg

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YAGMURLA DAMLAMA (dekaro)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sürgünler 3-5 cm iken, salkım uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su yürüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KİVİ, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minumum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 mL - 1 L
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	Yumru büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FİDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR
* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozaji aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.
Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO : 2025TO6462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr