

EC FERTİLİZER
Kalsiyum Klorür Çözeltisi

Ca Power

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama	Topraktan (Damlama sulama ile) Uygulama dekar
MEYVE AĞAÇLARI (Antep fıstığı, zeytin, seftali, kiraz, Kayısı nar vb.)	Çiçeklenme başlangıcından itibaren en az 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
NARENCİYE (portakal, mandarin, limon vb.)	1. Uygulama sürgünler oluşmadan 2. Uygulama çiçeklenmeden sonra	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
SEBZELER (domates, biber, patlıcan, salatalık)	Çiçeklenmeden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
Kavun karpuz	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAĞ	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YUMRULU BİTKİLER (pancar, patates, soğan, sarımsak, turp vb.)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAKLAGİLLER (yer fıstığı, soya, fasulye, nohut, mercimek)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
AYÇİÇEĞİ	4-6 yapraklı dönemden itibaren	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
MISIR	Bitki 30-40 cm boya erişince ve teppe püskülü çıktığında	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
PAMUK	4-6 yapraklı iken (sadece bitki sıralarına) taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi ilk kaza dönemi	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YEM BİTKİLERİ (yonca, fığ, korunga vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
HUBUBAT (buğday, arpa, yulaf, çeltik)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
ÇİLEK	Kış dönemi sonunda-çiçeklenme öncesi ve sonrası-hasat süresince 15 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gölde, uyuma dönemi başında-tomurcuk fışırma gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
FİDANCILIKTA	Gelişme dönemlerinde 2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt

UYARILAR

* Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
* Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 29445
LİSANS NO :199
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde,
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr
www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER
Kalsiyum Klorür Çözeltisi

Ca Power

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama	Topraktan (Damlama sulama ile) Uygulama dekar
MEYVE AĞAÇLARI (Antep fıstığı, zeytin, seftali, kiraz, Kayısı nar vb.)	Çiçeklenme başlangıcından itibaren en az 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
NARENCİYE (portakal, mandarin, limon vb.)	1. Uygulama sürgünler oluşmadan 2. Uygulama çiçeklenmeden sonra	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
SEBZELER (domates, biber, patlıcan, salatalık)	Çiçeklenmeden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
Kavun karpuz	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAĞ	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YUMRULU BİTKİLER (pancar, patates, soğan, sarımsak, turp vb.)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAKLAGİLLER (yer fıstığı, soya, fasulye, nohut, mercimek)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
AYÇİÇEĞİ	4-6 yapraklı dönemden itibaren	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
MISIR	Bitki 30-40 cm boya erişince ve teppe püskülü çıktığında	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
PAMUK	4-6 yapraklı iken (sadece bitki sıralarına) taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi ilk kaza dönemi	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YEM BİTKİLERİ (yonca, fığ, korunga vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
HUBUBAT (buğday, arpa, yulaf, çeltik)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
ÇİLEK	Kış dönemi sonunda-çiçeklenme öncesi ve sonrası-hasat süresince 15 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gölde, uyuma dönemi başında-tomurcuk fışırma gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
FİDANCILIKTA	Gelişme dönemlerinde 2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt

UYARILAR

* Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
* Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 29445
LİSANS NO :199
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 20 L

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde,
No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr
www.merkezanadolu.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Algink Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 L su / da)	YERİNE DAMLAMA (dekar)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sürgünler 3-5 cm iken, salim uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tozlu su süzülme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar 15 gün ara ile	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Buğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, INCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANDOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 mL - 1 L
SEKİER PANCARI, TUTUN	Yumurta büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FİDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR

* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr