

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L / su)	TOPRAKTAN DAMLAMA (da)
NARENÇİYE	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-200 ml	1 - 1,5 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-200 ml	1 - 1,5 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-200 ml	1 - 1,5 L / da
BAĞ	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
ZEYTİN	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
MUZ	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
KIVI, İNCİR	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
DOMATES, BIBER	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
HIYAR, PATLICAN	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
KAVUN, KARPUZ	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
MERCİMEK, NOHUT	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	-
YERFISTIĞI	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	-
ÇELTİK	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	-
ÇAY	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
ŞEKER PANCARI, TUTUN	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
MEYVE FIDANLARI	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
HUBUBAT	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da

ÜRETİCİ FİRMA **merkez** ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

Organonimeral Ürünler
İkincil Element Katkılı Sıvı Organomineral Gübre

CA-Bot

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Organik Madde % 15
Toplam Azot (N) % 0,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 1
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) % 10
Format % 17
Maksimum Klor (Cl) % 1
pH Aralığı (5-7)

(w/w)



UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Tozunu / Dumanını / Gazını / Sisini / Buharını / Spreyini solumayınız.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

KARİŞİBİLİRLİK:

Ca-Bot tek başına uygulanmalıdır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TO4636
LİSANS NO : 29
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET: 1 L

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L / su)	TOPRAKTAN DAMLAMA (da)
NARENÇİYE	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-200 ml	1 - 1,5 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-200 ml	1 - 1,5 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-200 ml	1 - 1,5 L / da
BAĞ	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
ZEYTİN	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
MUZ	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
KIVI, İNCİR	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
DOMATES, BIBER	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
HIYAR, PATLICAN	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
KAVUN, KARPUZ	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
MERCİMEK, NOHUT	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	-
YERFISTIĞI	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	-
ÇELTİK	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	-
ÇAY	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
ŞEKER PANCARI, TUTUN	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
MEYVE FIDANLARI	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
HUBUBAT	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da

ÜRETİCİ FİRMA **merkez** ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

Organonimeral Ürünler
İkincil Element Katkılı Sıvı Organomineral Gübre

CA-Bot

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Organik Madde % 15
Toplam Azot (N) % 0,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 1
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) % 10
Format % 17
Maksimum Klor (Cl) % 1
pH Aralığı (5-7)

(w/w)



UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Tozunu / Dumanını / Gazını / Sisini / Buharını / Spreyini solumayınız.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

KARİŞİBİLİRLİK:

Ca-Bot tek başına uygulanmalıdır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TO4636
LİSANS NO : 29
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET: 1 L

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L / su)	TOPRAKTAN DAMLAMA (da)
NARENÇİYE	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-200 ml	1 - 1,5 L / da
ELMA, ARMUT vb.	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-200 ml	1 - 1,5 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-200 ml	1 - 1,5 L / da
BAĞ	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
ZEYTİN	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
MUZ	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
KIVI, İNCİR	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
DOMATES, BIBER	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
HIYAR, PATLICAN	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
KAVUN, KARPUZ	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
MERCİMEK, NOHUT	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	-
YERFISTIĞI	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	-
ÇELTİK	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	-
ÇAY	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
ŞEKER PANCARI, TUTUN	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
MEYVE FIDANLARI	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
HUBUBAT	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakaktan uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	100-150 ml	0,5-1L / da

ÜRETİCİ FİRMA **merkez** ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

Organonimeral Ürünler
İkincil Element Katkılı Sıvı Organomineral Gübre

CA-Bot

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Organik Madde % 15
Toplam Azot (N) % 0,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 1
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) % 10
Format % 17
Maksimum Klor (Cl) % 1
pH Aralığı (5-7)

(w/w)



UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Tozunu / Dumanını / Gazını / Sisini / Buharını / Spreyini solumayınız.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

KARİŞİBİLİRLİK:

Ca-Bot tek başına uygulanmalıdır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2023TO4636
LİSANS NO : 29
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET: 1 L