

Organomineral Ürünler

Cropmak

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,2-8,2)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

Organomineral Ürünler

Cropmak

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,2-8,2)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

Organomineral Ürünler

Cropmak

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,2-8,2)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

Organomineral Ürünler

Cropmak

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 L su / ha)	DAMLAMLA (dekar)
NARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEPTALY KAYIS, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Sargıllar 3-5 cm iken, salımlı uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, toktı su içirime dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FİTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HYAR, PATLICAN	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERİÇMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Erken gelişim döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SERİKER PANCARIL TUTUN	Yumurta bölünme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Karadışlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

Piyasaya sunacağınız etiket ile aynı alacağınız taahhüt eder, alınılın ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, haklarımızda yapılacak cezalı işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO6461
USANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET : 400 g

ÜRETİCİ FİRMA
merkez

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

Organomineral Ürünler

Cropmak

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 L su / ha)	DAMLAMLA (dekar)
NARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEPTALY KAYIS, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Sargıllar 3-5 cm iken, salımlı uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, toktı su içirime dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FİTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HYAR, PATLICAN	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERİÇMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Karadışlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SERİKER PANCARIL TUTUN	Yumurta bölünme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Karadışlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

Piyasaya sunacağınız etiket ile aynı alacağınız taahhüt eder, alınılın ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, haklarımızda yapılacak cezalı işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO6461
USANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET : 400 g

ÜRETİCİ FİRMA
merkez

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

Organomineral Ürünler

Cropmak

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 L su / ha)	DAMLAMLA (dekar)
NARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEPTALY KAYIS, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Sargıllar 3-5 cm iken, salımlı uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, toktı su içirime dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FİTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HYAR, PATLICAN	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERİÇMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Karadışlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SERİKER PANCARIL TUTUN	Yumurta bölünme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Karadışlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

Piyasaya sunacağınız etiket ile aynı alacağınız taahhüt eder, alınılın ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, haklarımızda yapılacak cezalı işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO6461
USANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET : 400 g

ÜRETİCİ FİRMA
merkez

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

Organomineral Ürünler

Cropmak

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 L su / ha)	DAMLAMLA (dekar)
NARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEPTALY KAYIS, KIRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAG	Sargıllar 3-5 cm iken, salımlı uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, toktı su içirime dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FİTİĞİ, Fındık	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KIVI, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
HYAR, PATLICAN	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitisim (İk. dönemlerinde (2. çiçekle kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERİÇMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFİSTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Karadışlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	-
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SERİKER PANCARIL TUTUN	Yumurta bölünme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Karadışlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

Piyasaya sunacağınız etiket ile aynı alacağınız taahhüt eder, alınılın ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, haklarımızda yapılacak cezalı işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO6461
USANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET : 400 g

ÜRETİCİ FİRMA
merkez

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

Organomineral Ürünler

Cropmak

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,2-8,2)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!