

Ec Fertilizer

DEMİR ŞELATİ - EDDHA

Ferro Class

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Demir (Fe)

EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe)

(w/w)

%6

%6

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı

(3-9)

Asit ve alkali topraklarda demir eksikliğini gidermek ve önlemek için granül görünümünde EDDHA ile şelatlı suda çözünür demir.

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI**



Ec Fertilizer
DEMİR ŞELATİ - EDDHA

Ferro Class

UYGULAMA DOZAJLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gr/dekar (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN gr/dekar (1 ton su ile)
DOMATES, BIBER, HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar	75-100	200-250
KAVUN, KARPUZ, KABAK			
ÇİLEK			
BAG, KIVI	Sürgün oluşumu başlangıcında	75-100	200-250
MUZ	Gelişme dönemi boyunca	200-250	300-350
NARENCİYE	İlk bahar sürgünleri 2-3 oranında uzandığında	100-150	200-250
KIRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
ELMA, ARMUT, AYVA			
ZEYTİN			
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren,	75-100	200-250
PATATES, ŞEKER PANCARI	Yumur irileşme döneminde	75-100	200-250
BUGDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde	75-100	-
PAMUK	Tarakanma başlangıcında, koza oluşumundan önce	75-100	200-250
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	5. yaprak açmadan önce	75-100	200-250
SOĞAN, SARIMSAK, HAVUÇ	Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250

UYARILAR

- * Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız.
- * Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- * Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- * Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞILIRLIK

Yüksek alkali ilaçlar, kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

FİRMA BEYAN

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışından olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

TESCİL NO : 28080
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET : 1 kg

İTHALATÇI FİRMA
merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Dışemealtı / ANTALYA
Telf: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr