

ORGANİK ÜRÜNLER

Hayvansal Menşeli
Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre

Makamin



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%40
Organik Karbon	%12
Organik Azot (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%1
Serbest Amino Asitler	%8
pH Aralığı	(7-9)



ORGANİK ÜRÜNLER

Hayvansal Menşeli
Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre

Makamin



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	%40
Organik Karbon	%12
Organik Azot (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%1
Serbest Amino Asitler	%8
pH Aralığı	(7-9)



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZI



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYARLAR
* Dikot çöceklerden, evcil hayvanlardan ve güdülerden uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmıyş olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen süreler içinde saklayınız.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanım, firmamızın kontrolü dışında oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksiinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NET: 400 gr

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.Ö.S.B. 24. Köyü Mahallesi 24. Caddesi No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr - www.merkezanadolukimya.com.tr

NET: 400 gr

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.Ö.S.B. 24. Köyü Mahallesi 24. Caddesi No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr - www.merkezanadolukimya.com.tr

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.



ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN (100 L su / da)	DAHLİLA (da/ha)
BARENÇİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g
SEFİTLİ KAYI, KIRAZ, VİŞNE, ERİK vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g
BAĞ	Şaraplık 35 cm ile, salıkın uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ilave ve ila konulmuş, toprak su yutma dönemi	50-100 g	250-500 g
ANTER PESTİL, FENKİ	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g
ZEYTİN	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ila uygulama	50-100 g	250-500 g
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g
KIVIL, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g
ROMATES, BİBER	Bikinin II. dönemlerinde (2. çiçek-kodur) 2. çiçekten hasatı kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g
AYRAN, PATLICAN	Bikinin II. dönemlerinde (2. çiçek-kodur) 2. çiçekten hasatı kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g
KAVUN, KARPUZ	Bikinin II. dönemlerinde (2. çiçek-kodur) 2. çiçekten hasatı kadar (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g
KİSİM ÇİÇEKÇİLİK	Salkım dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g
MERİMEK, NOHUT	Çiçeklenme bağlama minimum 2 uygulamaya	50-100 g	250-500 g
YERFESTİĞİ	Çiçeklenme öncesi	50-80 g	200-400 g
PANKUR, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim dönemlerinde minimum 2 uygulamaya	50-100 g	250-500 g
CELTİK	Karadikenin dönemlerinde 10 gün ara ile 2 uygulamaya	50-100 g	-
KAY	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g
SEKİRT PANCAR, ZİTİR	Yarın bağlama dönemi	50-100 g	250-500 g
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme dönemlerinde her uygulamaya	50-100 g	250-500 g
KURUBAT	Karadikenin dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-80 g	200-400 g