

EC FERTİLİZER
PK Gübresi Harmanlanmış

MAKFOSPOT

0-35-35+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

%(w/w)

Nötral Amonyum Sitrata ve Suda

Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)

%35

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)

%35

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

%35

Suda Çözünür Molibden (Mo)

%0,05

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%0,05

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN (da)
NARENCİYE	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ELMA, ARMUT vb.	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK VE NAR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
BAĞ	Salımlar 7-9 cm iken	100-150 g / 100 L	-
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
ZEYTİN	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
MUZ	Doğumdan önce	-	500 g / da
KİVİ, İNCİR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	500 g
DOMATES, BİBER	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	250-500 g / da
MERCİMEK	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
YERFISTIĞI	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR v.b.	Bitkiler 30-40 cm iken	100-150 g / 100 L	-
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
ŞEKER PANCARI,PATATES	Yumurru oluşum dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	100-150 g / 100 L	500 g / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakdan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprakdan uygulanabilir. Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmele birlikte tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

DEPOLAMA

* Ürün kendi orijinal ambalajında,serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. * Bu nedenle,ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak,üretici tarafından,ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2024TK9750
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET : 2 kg

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2
Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER
PK Gübresi Harmanlanmış

MAKFOSPOT

0-35-35+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

%(w/w)

Nötral Amonyum Sitrata ve Suda

Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)

%35

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)

%35

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

%35

Suda Çözünür Molibden (Mo)

%0,05

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%0,05

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

* Dikkat, çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN (da)
NARENCİYE	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ELMA, ARMUT vb.	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK VE NAR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g	-
BAĞ	Salımlar 7-9 cm iken	100-150 g / 100 L	-
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
ZEYTİN	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	-
MUZ	Doğumdan önce	-	500 g / da
KİVİ, İNCİR	Meyve tutumu dönemi	100-150 g / 100 L	500 g
DOMATES, BİBER	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Dikimden itibaren 10 gün ara ile	100-150 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	250-500 g / da
MERCİMEK	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
YERFISTIĞI	Çiçeklenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR v.b.	Bitkiler 30-40 cm iken	100-150 g / 100 L	-
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	-
ŞEKER PANCARI,PATATES	Yumurru oluşum dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	100-150 g / 100 L	500 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden sonra	100-150 g / 100 L	500 g / da

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakdan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprakdan uygulanabilir. Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmele birlikte tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

DEPOLAMA

* Ürün kendi orijinal ambalajında,serin ve kuru ortamda **0°C / +45°C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. * Bu nedenle,ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak,üretici tarafından,ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2024TK9750
LİSANS NO : 199
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET : 2 kg

ÜRETİCİ FİRMA

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2
Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr