



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

RootLife Powder

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	%40
Toplam Azot(N)	%7
Amonyum Azotu($\text{NH}_4\text{-N}$)	%5
Organik Azot(N)	%2
Toplam Fosfor Pentaoksit(P_2O_5)	%12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%12
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%2
Alginik Asit	%0,2
Serbest Aminoasitler	%8
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%24
Maksimum Nem	%20
Maksimum Klor (Cl)	%7
pH	(3,5 - 5,5)

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !**



UYARILAR

- * Dikkat, Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.* Temas halinde bol su ile yıkayınız.* Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

RootLife Powder

DEPOLAMA

* Ürün kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ. • KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK PH) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK PH), KLOR, ORGANİK, FOSFOR, ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ. • KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ. • KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIMI SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKENTÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ). • UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANILARI UZAK TUTUNUZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMA YLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK SORUNUZ. • ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100GR SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YADA 2 GR ÜRÜN DÖKÜP ÇÖZÜNÜZ, DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YADA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ BU UYGULAMADA MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
KAYISI	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyve gözü oluşum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ERİK (Can ve Papaz Eriği)	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyve gözü oluşum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyve gözü oluşum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
KIRAZ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyve gözü oluşum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ŞEFTALİ	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyve gözü oluşum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
NEKTARIN	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyve gözü oluşum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
BADEM	Çiçeklenme öncesi Hasat sonrası meyve gözü oluşum dönemi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
ELMA, ARMUT	Çiçeklenme öncesi	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²
DOMATES, BİBER, PATLICAN, SALATALIK	4-5 Yapraklı dönemden, çiçeklenme dönemine kadar olan periyotta	100 gr / 100 lt su	3-5 kg / 1000m ²

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm Sebze, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ve etiket bilgileri ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2022T02359
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Doğanbey / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

NET: 1 kg