MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

RUTİNEM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı :

Bacillus atrophaeus MAK-56,
Pseudomonas chlororaphis MAK-18

Toplam canlı Mikroorganizma sayısı:
$1x10^7$ kob/g

pH: 5,5-7,5

MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

merkez ANADOLU KİMYA

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

RUTİNEM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı :

Bacillus atrophaeus MAK-56,
Pseudomonas chlororaphis MAK-18

Toplam canlı Mikroorganizma sayısı:
$1x10^7$ kob/g

pH: 5,5-7,5

MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

merkez ANADOLU KİMYA

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

RUTİNEM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı :

Bacillus atrophaeus MAK-56,
Pseudomonas chlororaphis MAK-18

Toplam canlı Mikroorganizma sayısı:
$1x10^7$ kob/g

pH: 5,5-7,5

MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

merkez ANADOLU KİMYA

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

RUTİNEM

UYARILAR

- Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman olmadan kesinlikle kullanmayınız. Teneffüs etmeyiniz. • Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz. • Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. • Göz ve deri temasından kaçınınız. • Kullanırken maske, eldiven ve gözlük kullanınız. • Ürünü paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız. • Karışımı temiz bir tankta hazırlayıp iyice karıştırınız ve bir gece bekledikten sonra kullanınız. • Yüksek basınca çalışan ilaçlama aletleri ile uygulama yapmaktan kaçınınız. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIM RUTİNEM; Bacillus atrophaeus MAK-56, Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatlarını içeren bir üründür. **RUTİNEM;** içeriğinde bulunan Bacillus atrophaeus MAK-56 ve Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatlarının rizosferdeki PGPR etkileri sayesinde bitkilerin gelişimini destekler. Bu bakteriler; fosforu çözünür hale getirerek bitkinin fosfat alımını artırır, siderofor üretimi ile demirin bitki tarafından kullanılabilirliğini yükseltir, indol-3-asetik asit (IAA) üretimi yoluyla kök ve sürgün gelişimini teşvik eder ve toprakta bağlı halde bulunan kalsiyum gibi besin elementlerinin çözünmesine katkı sağlar. Bu sayede bitkiler daha güçlü ve dengeli bir vejetatif gelişme meydana gelir ve verim artışına olumlu katkıda bulunur.

RUTİNEM; Uygulaması ile rekabet gücü yüksek olan Bacillus atrophaeus MAK-56 ve Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatları bitkilerin kök bölgesine hızlı bir şekilde koloni olarak toprak taki makro ve mikro besin elementlerinin bitki için etkisinin artmasına yardımcı olur. **RUTİNEM;** Özellikle organik maddece fakir topraklarda uygulanacaksa organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse etkisinin artmasına yardımcı olur.

- **RUTİNEM;** Organik maddece zengin, nem oranı yüksek, yoğun pestisit veya kimyasal gübre kalıntısı içermeyen uygun topraklarda yılda bir kez uygulanması yeterlidir; ancak uygun olmayan toprak koşullarında 15–20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanması ürünün etkisinin artmasına yardımcı olur.

DEPOLAMA RUTİNEM kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direkt güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C) ortalama **24 aydır.** Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15–20 gün muhafaza edilebilir.

KULLANMA TEKNİK BİLGİLER Karışabilirlik: Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak organik gübrelerle karıştırılarak etkinlik artırılabilir.**Dozaj ve kullanım şekli: Seralarda;** Rutinem dekara 500 g olacak şekilde kullanılır. Temiz bir tankta 100 L su içerisinde iyice karıştırılarak düşük basınçlı pülverizatörle özellikle akşam saatlerinde toprak yüzeyine püskürtülerek ya da damlama sulama ile bitkilerin direkt kök bölgesine de verilebilir. **Tarla bitkilerinde:** Rutinem dekara 400 g olacak şekilde kullanılır. Temiz bir tankta 100 L su içerisinde çözülerek bitkilerin kök bölgesine uygulama yapılır.

Ürünün kullanımı için uygun toprak şartları RUTİNEM; pH'sı 5,5–7,5 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal ve pestisit gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çalışır. Özellikle tınlı olan bu topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve kısa sürede aktiviteleri görülmeye başlar. Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3–4 gün sonra ise **RUTİNEM** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15–20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 22–32 °C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur. **Bitki çeşidine göre uygulama zamanı, uygulama miktarı ve uygulama sıklığı RUTİNEM;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, daha önce yoğun pestisit ve kimyasal gübre uygulaması yapılmamış alanlarda çelik, fide ya da fidanların daldırılması veya toprağa sprey edilmesi şeklinde uygulanacak ise bir kez uygulanması yeterlidir. Ancak uygun olmayan toprak koşullarında sebzelerde bitkiler 10–15 cm büyüklüğüne ulaşınca, yeni tesis edilen meyve bahçelerindeki fidanlarda ise dikimden 10–15 gün sonra direkt bitkilerin kök bölgesine verilerek ikinci veya ikinci uygulamadan 10–15 gün sonra üçüncü uygulama yapılabilir. **Tavsiye edildiği ürünler:** Çilek, sebzeler, meyve ağaçları, narenciye, bağ, süs bitkileri, kavun, karpuz, hububat ve yeşil alanlar. **KULLANILAN ORGANİZMALARIN YAŞAM SÜRESİ** Bacillus atrophaeus MAK-56 ve Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatları özellikle topraktaki kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntı miktarı, nem oranı, organik madde miktarı ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak toprakta bitki kök bölgesine kolonize olduktan sonra 18 ay canlı kalabilmektedir. **FİRMA BEYANI** Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolama doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece, ürünün, teslim sırasındaki firma garantisi altındadır.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yaptıracak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO7023
LİSANS NO : 29
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 ay

NET: 500 g

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

RUTİNEM

UYARILAR

- Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman olmadan kesinlikle kullanmayınız. Teneffüs etmeyiniz. • Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz. • Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. • Göz ve deri temasından kaçınınız. • Kullanırken maske, eldiven ve gözlük kullanınız. • Ürünü paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız. • Karışımı temiz bir tankta hazırlayıp iyice karıştırınız ve bir gece bekledikten sonra kullanınız. • Yüksek basınca çalışan ilaçlama aletleri ile uygulama yapmaktan kaçınınız. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIM RUTİNEM; Bacillus atrophaeus MAK-56, Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatlarını içeren bir üründür. **RUTİNEM;** içeriğinde bulunan Bacillus atrophaeus MAK-56 ve Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatlarının rizosferdeki PGPR etkileri sayesinde bitkilerin gelişimini destekler. Bu bakteriler; fosforu çözünür hale getirerek bitkinin fosfat alımını artırır, siderofor üretimi ile demirin bitki tarafından kullanılabilirliğini yükseltir, indol-3-asetik asit (IAA) üretimi yoluyla kök ve sürgün gelişimini teşvik eder ve toprakta bağlı halde bulunan kalsiyum gibi besin elementlerinin çözünmesine katkı sağlar. Bu sayede bitkiler daha güçlü ve dengeli bir vejetatif gelişme meydana gelir ve verim artışına olumlu katkıda bulunur.

RUTİNEM; Uygulaması ile rekabet gücü yüksek olan Bacillus atrophaeus MAK-56 ve Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatları bitkilerin kök bölgesine hızlı bir şekilde koloni olarak toprak taki makro ve mikro besin elementlerinin bitki için etkisinin artmasına yardımcı olur. **RUTİNEM;** Özellikle organik maddece fakir topraklarda uygulanacaksa organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse etkisinin artmasına yardımcı olur.

- **RUTİNEM;** Organik maddece zengin, nem oranı yüksek, yoğun pestisit veya kimyasal gübre kalıntısı içermeyen uygun topraklarda yılda bir kez uygulanması yeterlidir; ancak uygun olmayan toprak koşullarında 15–20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanması ürünün etkisinin artmasına yardımcı olur.

DEPOLAMA RUTİNEM kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direkt güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C) ortalama **24 aydır.** Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15–20 gün muhafaza edilebilir.

KULLANMA TEKNİK BİLGİLER Karışabilirlik: Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak organik gübrelerle karıştırılarak etkinlik artırılabilir.**Dozaj ve kullanım şekli: Seralarda;** Rutinem dekara 500 g olacak şekilde kullanılır. Temiz bir tankta 100 L su içerisinde iyice karıştırılarak düşük basınçlı pülverizatörle özellikle akşam saatlerinde toprak yüzeyine püskürtülerek ya da damlama sulama ile bitkilerin direkt kök bölgesine de verilebilir. **Tarla bitkilerinde:** Rutinem dekara 400 g olacak şekilde kullanılır. Temiz bir tankta 100 L su içerisinde çözülerek bitkilerin kök bölgesine uygulama yapılır.

Ürünün kullanımı için uygun toprak şartları RUTİNEM; pH'sı 5,5–7,5 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal ve pestisit gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çalışır. Özellikle tınlı olan bu topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve kısa sürede aktiviteleri görülmeye başlar. Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3–4 gün sonra ise **RUTİNEM** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15–20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 22–32 °C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur. **Bitki çeşidine göre uygulama zamanı, uygulama miktarı ve uygulama sıklığı RUTİNEM;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, daha önce yoğun pestisit ve kimyasal gübre uygulaması yapılmamış alanlarda çelik, fide ya da fidanların daldırılması veya toprağa sprey edilmesi şeklinde uygulanacak ise bir kez uygulanması yeterlidir. Ancak uygun olmayan toprak koşullarında sebzelerde bitkiler 10–15 cm büyüklüğüne ulaşınca, yeni tesis edilen meyve bahçelerindeki fidanlarda ise dikimden 10–15 gün sonra direkt bitkilerin kök bölgesine verilerek ikinci veya ikinci uygulamadan 10–15 gün sonra üçüncü uygulama yapılabilir. **Tavsiye edildiği ürünler:** Çilek, sebzeler, meyve ağaçları, narenciye, bağ, süs bitkileri, kavun, karpuz, hububat ve yeşil alanlar. **KULLANILAN ORGANİZMALARIN YAŞAM SÜRESİ** Bacillus atrophaeus MAK-56 ve Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatları özellikle topraktaki kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntı miktarı, nem oranı, organik madde miktarı ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak toprakta bitki kök bölgesine kolonize olduktan sonra 18 ay canlı kalabilmektedir. **FİRMA BEYANI** Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolama doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece, ürünün, teslim sırasındaki firma garantisi altındadır.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yaptıracak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO7023
LİSANS NO : 29
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 ay

NET: 500 g

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

RUTİNEM

UYARILAR

- Maske, eldiven, gözlük ve koruyucu ekipman olmadan kesinlikle kullanmayınız. Teneffüs etmeyiniz. • Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz. • Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. • Göz ve deri temasından kaçınınız. • Kullanırken maske, eldiven ve gözlük kullanınız. • Ürünü paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız. • Karışımı temiz bir tankta hazırlayıp iyice karıştırınız ve bir gece bekledikten sonra kullanınız. • Yüksek basınca çalışan ilaçlama aletleri ile uygulama yapmaktan kaçınınız. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIM RUTİNEM; Bacillus atrophaeus MAK-56, Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatlarını içeren bir üründür. **RUTİNEM;** içeriğinde bulunan Bacillus atrophaeus MAK-56 ve Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatlarının rizosferdeki PGPR etkileri sayesinde bitkilerin gelişimini destekler. Bu bakteriler; fosforu çözünür hale getirerek bitkinin fosfat alımını artırır, siderofor üretimi ile demirin bitki tarafından kullanılabilirliğini yükseltir, indol-3-asetik asit (IAA) üretimi yoluyla kök ve sürgün gelişimini teşvik eder ve toprakta bağlı halde bulunan kalsiyum gibi besin elementlerinin çözünmesine katkı sağlar. Bu sayede bitkiler daha güçlü ve dengeli bir vejetatif gelişme meydana gelir ve verim artışına olumlu katkıda bulunur.

RUTİNEM; Uygulaması ile rekabet gücü yüksek olan Bacillus atrophaeus MAK-56 ve Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatları bitkilerin kök bölgesine hızlı bir şekilde koloni olarak toprak taki makro ve mikro besin elementlerinin bitki için etkisinin artmasına yardımcı olur. **RUTİNEM;** Özellikle organik maddece fakir topraklarda uygulanacaksa organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse etkisinin artmasına yardımcı olur.

- **RUTİNEM;** Organik maddece zengin, nem oranı yüksek, yoğun pestisit veya kimyasal gübre kalıntısı içermeyen uygun topraklarda yılda bir kez uygulanması yeterlidir; ancak uygun olmayan toprak koşullarında 15–20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanması ürünün etkisinin artmasına yardımcı olur.

DEPOLAMA RUTİNEM kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında, kuru ve havadar bir yerde, direkt güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında (+25 °C) ortalama **24 aydır.** Toprakta canlı kalma süresi ortalama 18 aydır. Açılmış ambalajlar hemen kullanılmalıdır. Ancak, su ile karıştırılmadan orijinal ambalaj içinde ürün kalmış ise kontaminasyona sebep olmamak için kapağı sıkıca kapatılarak +5 °C'de 15–20 gün muhafaza edilebilir.

KULLANMA TEKNİK BİLGİLER Karışabilirlik: Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak organik gübrelerle karıştırılarak etkinlik artırılabilir.**Dozaj ve kullanım şekli: Seralarda;** Rutinem dekara 500 g olacak şekilde kullanılır. Temiz bir tankta 100 L su içerisinde iyice karıştırılarak düşük basınçlı pülverizatörle özellikle akşam saatlerinde toprak yüzeyine püskürtülerek ya da damlama sulama ile bitkilerin direkt kök bölgesine de verilebilir. **Tarla bitkilerinde:** Rutinem dekara 400 g olacak şekilde kullanılır. Temiz bir tankta 100 L su içerisinde çözülerek bitkilerin kök bölgesine uygulama yapılır.

Ürünün kullanımı için uygun toprak şartları RUTİNEM; pH'sı 5,5–7,5 arasında, organik maddece zengin, nem oranı düşük olmayan, yoğun kimyasal ve pestisit gübre kalıntısı içermeyen topraklarda çalışır. Özellikle tınlı olan bu topraklarda bakteriler hızla çoğalarak istenilen sayıya ulaşır ve kısa sürede aktiviteleri görülmeye başlar. Genel olarak kimyasal tarım ilaçları ve kimyevi gübrelerle birlikte aynı anda kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlamanın zorunlu olduğu durumlarda önce ilaçlama ve 3–4 gün sonra ise **RUTİNEM** uygulanması yapılır. Uygun olmayan toprak koşullarında organik madde miktarı yüksek gübreler (amino asitler gibi) ile kombine edilirse ya da 15–20 gün arayla 2 veya 3 kez damla sulama ile toprağa tekrar uygulanırsa ürünün etkinliği artırılabilir. 22–32 °C toprak sıcaklığı ürün kullanımı için uygundur. **Bitki çeşidine göre uygulama zamanı, uygulama miktarı ve uygulama sıklığı RUTİNEM;** organik maddece zengin, nem oranı yüksek, daha önce yoğun pestisit ve kimyasal gübre uygulaması yapılmamış alanlarda çelik, fide ya da fidanların daldırılması veya toprağa sprey edilmesi şeklinde uygulanacak ise bir kez uygulanması yeterlidir. Ancak uygun olmayan toprak koşullarında sebzelerde bitkiler 10–15 cm büyüklüğüne ulaşınca, yeni tesis edilen meyve bahçelerindeki fidanlarda ise dikimden 10–15 gün sonra direkt bitkilerin kök bölgesine verilerek ikinci veya ikinci uygulamadan 10–15 gün sonra üçüncü uygulama yapılabilir. **Tavsiye edildiği ürünler:** Çilek, sebzeler, meyve ağaçları, narenciye, bağ, süs bitkileri, kavun, karpuz, hububat ve yeşil alanlar. **KULLANILAN ORGANİZMALARIN YAŞAM SÜRESİ** Bacillus atrophaeus MAK-56 ve Pseudomonas chlororaphis MAK-18 bakteri izolatları özellikle topraktaki kimyasal pestisit ve kimyasal gübre kalıntı miktarı, nem oranı, organik madde miktarı ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak toprakta bitki kök bölgesine kolonize olduktan sonra 18 ay canlı kalabilmektedir. **FİRMA BEYANI** Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolama doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece, ürünün, teslim sırasındaki firma garantisi altındadır.

Etiket bilgilerinin, piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yaptıracak olan cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2025TO7023
LİSANS NO : 29
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
RAF ÖMRÜ : Üretim tarihinden itibaren 24 ay

NET: 500 g

ÜRETİCİ FİRMA
merkez ANADOLU KİMYA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

RUTİNEM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Canlı Mikroorganizma Adı :

Bacillus atrophaeus MAK-56,
Pseudomonas chlororaphis MAK-18

Toplam canlı Mikroorganizma sayısı:
$1x10^7$ kob/g

pH: 5,5-7,5

MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

merkez ANADOLU KİMYA