

UYARILAR

* Dikkat Çocuklardan, evcil Hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. *Temas halinde bol su ile yıkayınız.*Önerilen dozajı aşmayınız. *Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuruve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK, ZEYTİN ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
KİVİ, İNCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-100 gr/100 lt su	-
YERFISTIĞI, ÇAY	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
MEYVE FIDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0,5-1 kg/1000 m²
HUBUBAT, ÇELTİK	Kardeşlenme dönemde	200-250 gr/100 lt su	-
YEŞİL ALANLAR	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	-

NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm Sebze-lerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

ÜRETİCİ FİRMA



MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER
NPK Gübresi Harmanlanmış

special fert

18-18-18+ME

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

•Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz
•Kuvvetli alkali (YÜKSEK Ph) ve kuvvetli Asitlerle (DÜŞÜK Ph), Klor, ORGANİK FOSFOR, ALÜMİNYUM içeren kimyasallarla ve Aktif Kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.•Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.•Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.•Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve Gözlük Takınız).•Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önlemi almamış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.•Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz. •Üretici firma veya bayi ile temas kurmadığınız durumlarda : Şeffaf bir kap içerisine 100 GR su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 GR üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malmemeden 1 ya da 2 GR ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malmemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız.Bu uygulamayı mutlaka açık alanda belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

Tescil No : 28801
Lisans No : 199
Üretim Tarihi :
Parti No :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 5 kg



algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginiik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L su / da)	YERİNE DAMLAMA (dekor.)
NARENCİYE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Sürgünler 3-5 cm iken, salımlı uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su oluşturma dönemi	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki yaz dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MUZ	Doğum öncesi	50-100 g	250-500 g / da
KİVİ, İNCİR	Filizlenme evresi	50-100 g	250-500 g / da
DOMATES, BİBER	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
HIYAR, PATLICAN	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KAVUN, KARPUZ	Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçekte kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)	50-100 g	250-500 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi	50-100 g	250-500 g / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her biçimden sonra	50-100 g	500 mL - 1L
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	Yumurta büyüme dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDANLARI	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama	50-100 g	250-500 g / da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	50-100 g	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	50-100 g	250-500 g / da

UYARILAR
* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
* Önerilen dozajı aşmayınız.
* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

TESCİL NO :2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

