

nektar

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

SOLUNEC

16-8-24+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%16
Amonyum Azotu (N)	%5,5
Nitrat Azotu (N)	% 5,6
Üre Azotu (N)	% 4,9
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	% 8
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%24
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,008
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,008
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,04

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı: (Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 16-8-24+ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve büyüme döneminde	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme döneminde	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
BAĞ	Tatlı su yürüdükten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	İç dolun döneminde	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve büyüme döneminde	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KIVI, İNCİR	Meyve büyüme döneminde	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
DOMATES, BIBER	Meyve büyüme döneminde	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme döneminde	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Meyve büyüme döneminde	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Hasattan 1 ay önce	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	Tane dolun dönemi	70-100 g / 100 L su	-
YERFISTIĞI	Tane dolun dönemi	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Hasattan 1 ay önce	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Tane dolun dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Biçimden 15 gün önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Sökümden önce	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Tane dolun dönemi	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- * Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- * Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız.)
- * Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önemi alması diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmaya veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- * Üretici firma veya bayi ile temasa kurmadığınız durumlarda, şeffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malmelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temasa ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9813
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET: 2,5 kg

ÜRETİCİ FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com

nektar

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

SOLUNEC

16-8-24+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%16
Amonyum Azotu (N)	%5,5
Nitrat Azotu (N)	% 5,6
Üre Azotu (N)	% 4,9
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	% 8
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%24
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,008
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,008
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,04

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı: (Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 16-8-24+ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve büyüme döneminde	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Meyve büyüme döneminde	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
BAĞ	Tatlı su yürüdükten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	İç dolun döneminde	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve büyüme döneminde	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KIVI, İNCİR	Meyve büyüme döneminde	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
DOMATES, BIBER	Meyve büyüme döneminde	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme döneminde	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Meyve büyüme döneminde	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Hasattan 1 ay önce	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	Tane dolun dönemi	70-100 g / 100 L su	-
YERFISTIĞI	Tane dolun dönemi	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	Hasattan 1 ay önce	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Tane dolun dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Biçimden 15 gün önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Sökümden önce	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Tane dolun dönemi	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- * Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- * Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız.)
- * Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önemi alması diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmaya veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- * Üretici firma veya bayi ile temasa kurmadığınız durumlarda, şeffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malmelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temasa ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9813
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET: 2,5 kg

ÜRETİCİ FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com