

nektar

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

SOLUNEC

18-18-18+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%18
Amonyum Azotu (N)	%5
Nitrat Azotu (N)	%6
Üre Azotu (N)	%7
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%18
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,01
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,04

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 18-18-18-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KIVI, INCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çiğsttan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çiğsttan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çiğsttan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumurru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HUBUBAT(Buğday,Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, topraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için topraktan uygulanabilir. Tüm sebze, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulamaya dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- * Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kökürü içeren bileşimlerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- * Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözük takınız.)
- * Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlılar uzak tutunuz.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- * Üretici firma veya bayi ile temasa kurmadığınız durumlarda, seffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz maldemeden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malzemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temis halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozaı aşmayınız.
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılan olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisati altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9811
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döğemealti / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 – Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com

nektar

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

SOLUNEC

18-18-18+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%18
Amonyum Azotu (N)	%5
Nitrat Azotu (N)	%6
Üre Azotu (N)	%7
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%18
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,01
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,04

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 18-18-18-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KIVI, INCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çiğsttan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çiğsttan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çiğsttan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumurru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HUBUBAT(Buğday,Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, topraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için topraktan uygulanabilir. Tüm sebze, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulamaya dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- * Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kökürü içeren bileşimlerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- * Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözük takınız.)
- * Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlılar uzak tutunuz.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- * Üretici firma veya bayi ile temasa kurmadığınız durumlarda, seffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz maldemeden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malzemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temis halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozaı aşmayınız.
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılan olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisati altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9811
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döğemealti / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 – Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com

nektar

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

SOLUNEC

18-18-18+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%18
Amonyum Azotu (N)	%5
Nitrat Azotu (N)	%6
Üre Azotu (N)	%7
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%18
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,01
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,03
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,03
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,04
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,04

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 18-18-18-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, Fındık	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KIVI, INCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çiğsttan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çiğsttan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çiğsttan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumurru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HUBUBAT(Buğday,Arpa, Çavdar, Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, topraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için topraktan uygulanabilir. Tüm sebze, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulamaya dozu ihtiyaca bağlı olarak değişimle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- * Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kökürü içeren bileşimlerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- * Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözük takınız.)
- * Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlılar uzak tutunuz.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- * Üretici firma veya bayi ile temasa kurmadığınız durumlarda, seffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz maldemeden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malzemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temis halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozaı aşmayınız.
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılan olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisati altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9811
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA
nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döğemealti / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 – Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com