



EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 20-20-20+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%20
Amonyum Azotu (N)	%4,7
Nitrat Azotu (N)	%6,1
Üre Azotu (N)	%9,2
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%20
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,005
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,005
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,02
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,01
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,01
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,02

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı:
(Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 20-20-20-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KIVI, INCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çiğştan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HUBUBAT(Buğday,Arpa,Çavdar,Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulamada dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- * Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerde (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- * Kullanım sırasında ve sonrasında uygulamaya bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız.)
- * Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmaya veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- * Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda; seffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz malden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen maddelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamaya mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacakmış taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9807
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA

nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döğemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com



EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 20-20-20+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%20
Amonyum Azotu (N)	%4,7
Nitrat Azotu (N)	%6,1
Üre Azotu (N)	%9,2
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%20
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,005
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,005
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,02
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,01
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,01
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,02

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı:
(Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 20-20-20-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KIVI, INCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çiğştan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HUBUBAT(Buğday,Arpa,Çavdar,Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulamada dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- * Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerde (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- * Kullanım sırasında ve sonrasında uygulamaya bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız.)
- * Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmaya veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- * Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda; seffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz malden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen maddelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamaya mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacakmış taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9807
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA

nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döğemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com



EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ SOLUNEC 20-20-20+ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot(N)	%20
Amonyum Azotu (N)	%4,7
Nitrat Azotu (N)	%6,1
Üre Azotu (N)	%9,2
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%20
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,005
EDTA ile Şelatlı Bakır(Cu)	%0,005
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Demir(Fe)	%0,02
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,01
EDTA ile Şelatlı Mangan(Mn)	%0,01
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,02
EDTA ile Şelatlı Çinko(Zn)	%0,02

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı:
(Cu, Fe, Mn ve Zn) için (3-9)'dur.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



SOLUNEC 20-20-20-ME

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve tutumundan sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan önce	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KIVI, INCİR	Meyve tutumundan sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
DOMATES, BIBER	Çiçeklenmeden hemen sonra	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme başlangıcında	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren	50-100 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çiğştan itibaren	70-100 g / 100 L su	-
YERFİSTİĞİ	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.	İlk çiğştan itibaren	100-150 g / 100 L su	-
ÇELTİK	Sapa kalkma dönemi	100-150 g / 100 L su	-
ÇAY	Her biçimden sonra	100-150 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	100-150 g / 100 L su	-
MEYVE FIDANLARI	Fidan gelişim dönemi	150-200 g / 100 L su	0,5-1 kg/1000 m ²
HUBUBAT(Buğday,Arpa,Çavdar,Yulaf vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-250 g / 100 L su	-
YEŞİL ALANLAR	Her biçimden sonra	200-300 g / 100 L su	-

* **NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulamada dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- * Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- * Kuvvetli alkali (yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerde (düşük Ph), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- * Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- * Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız.
- * Kullanım sırasında ve sonrasında uygulamaya bölgesine girenken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız.)
- * Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve koruma önlemi alınmış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- * Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmaya veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz.
- * Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda; seffaf bir kap içerisinde 100 g su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz malden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen maddelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamaya mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

UYARILAR

- * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozağı aşmayınız.
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajından, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.

- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolanmadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacakmış taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 9807
LİSANS NO : 116
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA

nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
AOSB 2. Kım Mahallesi 24. Cadde No:2 Döğemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40 - Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com / www.nektartarim.com