

[illegible]

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI

Sebzelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-500 cc olarak çimlenmeden ya da ilk yaprakların yüzeye çıkmasından 3 hafta sonra uygulamanıya başlanılmıřtır. Düzenli aralıklarla hasada kadar uygulama tekrarlanmaktadı.

Tař Çekirdekli Meyvelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçekler oluřmaya bařladıėında, meyve ve tutum periyodu boyunca düzenli aralıklarla uygulanmaktadı.

Baėlarda: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçeklerin oluřmaya bařladıėı dönemde düzenli aralıklarla uygulanmaktadı. Uygulama hasattan 2-3 hafta önce keřilmelidir.

Çiçeklerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc su çiçeklenme bařlangıcından itibaren düzenli aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Patateslerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc ilk çiçeklerden 3 hafta sonra yumrulanın oluřmaya ve řiřmeye bařladıėı dönemde uygulamanıya tekrarlayın.

Muz: Çiçeklenmeden sonra yaprakların 100 litre suya 200 cc olarak yaprakların uygulama yapmařını. İřtiřaē duyulan dönemlerde uygulamayı tekrarlayınız.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldıėında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve kařınımlardan dolayı doėabilecek olumsuzluklar firmamız garantisidir.Dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama řartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkilili olmayıř ve vs.) kullanıcının sorumluluėundadır.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacaėımız ürünün içeriėi etiket bilgileri ile tescil belgesindeki deėerlerin aynısı olacaėını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaai işlemleri kabul ederiz.

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %18

Suda Çözünür Bor (B) %0,06




(w/w)

%18

%0,06



İTHALATÇI FİRMA

NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

AOSB 2, Kısım Mahallesi, 24, Cadde

No: 2 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0 242 258 0140

Faks: 0 242 258 0148

info@nektartarim.com

www.nektartarim.com

ÜRETİCİ FİRMA

SPRAYGRO LIQUID FERTILIZERS PTY. LTD.

52 Bedford Street, Gilmann,

South Australia 5013 PO Box

Fax: 00 618 8240 1844

Tel: 00 618 8247 7266

ÇÖZÜNRÜLÜK

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orjinal ambalajında normal řartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürün doėrudan güneř işıėına maruz bırakmayınız.Normal řartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklıėı +5 İla +40 °C derece arasıında olmalıdır.

UYARILAR:

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.

*Kullanılmıř olan boş ambalajları başka amaēlarla kullanmayınız, imha ediniz.

*Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

LİSANS NO : 116

TESCİL NO : 2022TK4071

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULL. TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET: 1 L

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!

SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI

Sebzelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-500 cc olarak çimlenmeden ya da ilk yaprakların yüzeye ekimansından 3 hafta sonra uygulamaya başlanılmıtır. Düzenli aralıklarla hasada kadar uygulama tekrarlanmalıdır.

Taş Çekirdekli Meyvelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçekler oluşmaya başladığında, meyve ve tutum periyodu boyunca düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.

Bağlarda: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçeklerin oluşmaya başladığı dönemde düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Uygulama hasattan 2-3 hafta önce kesilmelidir.

Çiçeklerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc su çiçeklenme başlangıcından itibaren düzenli aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Patateslerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc ilk çıkışlardan 3 hafta sonra yumurtlama oluşmaya ve şişmeye başladığı dönemde uygulamaya tekrarlanır.

Muz: Çiçeklenmeden sonra yapraktan 100 litre suya 200 cc olarak yapraktan uygulama yapılır. İhtiyaç duyulan dönemlerde uygulamaya tekrarlanıyaz.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve yanlışlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmamız garantisini dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkil olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynıını olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 723 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri kabul ederiz.

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %18

Suda Çözünür Bor (B) %0,06

(w/w)

18

0,06

nektar

İTHALATÇI FİRMA

NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

AOSB 2, Kısım Mahallesi, 24. Cadde

No: 2 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0 242 258 01 40

Faks: 0 242 258 01 48

info@nektartarim.com

www.nektartarim.com

ÜRETİCİ FİRMA

SPRAYGRO LIQUID FERTILIZERS PTY. LTD.

52 Bedford Street, Gilmann,

South Australia 5013 PO Box

Fax: 00 618 8240 1844

Tel: 00 618 8240 7266

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

18

0,06

ÇÖZÜNÜRLÜK

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 ile +40 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

*Gübrelemenin esnasında maske, eldiven ve gözükullanınız.

*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.

*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.

*Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

LİSANS NO : 116

TESCİL NO : 2022T14071

PARTİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULL. TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET: 1 L

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI

Sebzeelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-500 cc olarak çimlenmeden ya da ilk yaprakların yüzeye çıkmasından 3 hafta sonra uygulamaya başlanılmıtır. Düzenli aralıklarla hasada kadar uygulama tekrarlanmalıdır.

Taş Çekirdekli Meyvelerde: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçekler oluşmaya başladığında, meyve ve tutum periyodu boyunca düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.

Bağlarda: Yapraktan 100 litre suya 200-400 cc ilk çiçeklerin oluşmaya başladığı dönemde düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Uygulama hasattan 2-3 hafta önce kesilmelidir.

Çileklerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc su çiçeklenme başlangıcından itibaren düzenli aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Patatesilerde: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc ilk çıkışardan 3 hafta sonra yumruların oluşmaya ve şişmeye başladığı dönemde uygulamayı tekrarlının.

Muz: Çiçeklenmeden sonra yaprakтан 100 litre suya 200 cc olarak yaprakтан uygulama yapılınız. İhtiyaç duyulan dönemlerde uygulamayı tekrarlayınız.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, temsilcilerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmamız garantisinden dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tesdi belgesindeki doğerlerin aynına olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (B)

(w/w)
%18
%0,06

İTHALATÇI FİRMA
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallelesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealti/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Fax: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

FIRMRITE CMB

ÜRETİCİ FİRMA
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Tel: 00 618 8240 1844
Fax: 00 618 8447 7266

ÇÖZÜNÜRLÜK

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünürlük hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 ila +40 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.
- *Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

LİSANS NO	: 116
TESCİL NO	: 2022TK4071
PARTİ NO	:
ÜRETİM TARİHİ	:
SON KULL. TARİHİ	: Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET: 1 L

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!