

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXi-PHOS®
(7-29-0)

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXi-PHOS®
(7-29-0)

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXi-PHOS®
(7-29-0)**KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI**

Tarla bitkilerinde: Çıkışlardan 6 hafta sonra bitki besin elementlerinin verilmeye başlanıldığı dönemde yapraktan 200-400cc/100litre su

Sert ve yumuşakçekerdekl meyvelerde: Çiçeklenmeden önce ilk uygulama yapılır. İhtiyaç görüldüğü takdirde çiçeklenmeden sonra yapraktan 400-600 cc / 100 litre su ile ikinci uygulama yapılır.

Kesme çiçekçilikte: Şaşırtmadan 1 hafta sonra ve ilk çiçeklenmeden sonra ihtiyaç görülür ise 200-400 cc / 100 litre su ile yapraktan uygulama yapılır.

Sebzelerde: Gelişme dönemi boyunca uygulamalar düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yapraktan uygulamalar normal programa paralel olarak yapraktan 200-400 cc / 100 litre su ile 3-5 uygulama yapılabilir.

Patates: Yaprakların tamamen kapladığı gölgelik oluşturduğu dönemde yaprakları tamamen ıslatacak şekilde yapraktan 200-400cc/100 litre su ile püskürtme yapılmalıdır.

Bağlarda: Çiçeklenmeden önce en az bir defa sonra düzenli aralıklarla yapraktan 250-300 cc / 100 litre su ile uygulama tekrarlanmalıdır.

Narenciye: Çiçeklenme döneminden hemen önce, petal yapraklarının düşme döneminde ve 4 hafta aralıklarla yapraktan 400-600cc/100 litre su uygulama yapılır.

Zeytinlerde: Eksikliğin görüldüğü/ihtiyaç duyulan dönemlerde yapraktan 250-300 cc / 100 litre su ile uygulama yapılır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vb.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Garanti edilen içerik

%(w /w)

Toplam Azot (N)**%7****Amonyum Azotu (NH₄-N)****%7****Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P₂O₅)****%29**

İTHALATÇI FİRMA
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

ÜRETİCİ FİRMA
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Tel:00 618 8447 7266
Faks:00 618 8240 1844



ÇÖZÜNÜRLÜK : Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI : Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az **3 yıl** süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + **5 ile + 40 °C** derece arasında olmalıdır.

UYARILAR : *Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, Teması halinde bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerleri aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

LİSANS NO : 116
TESCİL NO : 2022TK4073
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULL. TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET: 10 L

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXi-PHOS®
(7-29-0)

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXi-PHOS®
(7-29-0)

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXi-PHOS®
(7-29-0)**KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI**

Tarla bitkilerinde: Çıkışlardan 6 hafta sonra bitki besin elementlerinin verilmeye başlanıldığı dönemde yapraktan 200-400cc/100litre su

Sert ve yumuşakçekerdekl meyvelerde: Çiçeklenmeden önce ilk uygulama yapılır. İhtiyaç görüldüğü takdirde çiçeklenmeden sonra yapraktan 400-600 cc / 100 litre su ile ikinci uygulama yapılır.

Kesme çiçekçilikte: Şaşırtmadan 1 hafta sonra ve ilk çiçeklenmeden sonra ihtiyaç görülür ise 200-400 cc / 100 litre su ile yapraktan uygulama yapılır.

Sebzelerde: Gelişme dönemi boyunca uygulamalar düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yapraktan uygulamalar normal programa paralel olarak yapraktan 200-400 cc / 100 litre su ile 3-5 uygulama yapılabilir.

Patates: Yaprakların tamamen kapladığı gölgelik oluşturduğu dönemde yaprakları tamamen ıslatacak şekilde yapraktan 200-400cc/100 litre su ile püskürtme yapılmalıdır.

Bağlarda: Çiçeklenmeden önce en az bir defa sonra düzenli aralıklarla yapraktan 250-300 cc / 100 litre su ile uygulama tekrarlanmalıdır.

Narenciye: Çiçeklenme döneminden hemen önce, petal yapraklarının düşme döneminde ve 4 hafta aralıklarla yapraktan 400-600cc/100 litre su uygulama yapılır.

Zeytinlerde: Eksikliğin görüldüğü/ihtiyaç duyulan dönemlerde yapraktan 250-300 cc / 100 litre su ile uygulama yapılır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vb.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Garanti edilen içerik

%(w /w)

Toplam Azot (N)**%7****Amonyum Azotu (NH₄-N)****%7****Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P₂O₅)****%29**

İTHALATÇI FİRMA
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

ÜRETİCİ FİRMA
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Tel:00 618 8447 7266
Faks:00 618 8240 1844



ÇÖZÜNÜRLÜK : Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI : Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az **3 yıl** süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + **5 ile + 40 °C** derece arasında olmalıdır.

UYARILAR : *Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, Teması halinde bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerleri aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

LİSANS NO : 116
TESCİL NO : 2022TK4073
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULL. TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET: 10 L

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXi-PHOS®
(7-29-0)

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXi-PHOS®
(7-29-0)

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXi-PHOS®
(7-29-0)**KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI**

Tarla bitkilerinde: Çıkışlardan 6 hafta sonra bitki besin elementlerinin verilmeye başlanıldığı dönemde yapraktan 200-400cc/100litre su

Sert ve yumuşakçekerdekl meyvelerde: Çiçeklenmeden önce ilk uygulama yapılır. İhtiyaç görüldüğü takdirde çiçeklenmeden sonra yapraktan 400-600 cc / 100 litre su ile ikinci uygulama yapılır.

Kesme çiçekçilikte: Şaşırtmadan 1 hafta sonra ve ilk çiçeklenmeden sonra ihtiyaç görülür ise 200-400 cc / 100 litre su ile yapraktan uygulama yapılır.

Sebzelerde: Gelişme dönemi boyunca uygulamalar düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yapraktan uygulamalar normal programa paralel olarak yapraktan 200-400 cc / 100 litre su ile 3-5 uygulama yapılabilir.

Patates: Yaprakların tamamen kapladığı gölgelik oluşturduğu dönemde yaprakları tamamen ıslatacak şekilde yapraktan 200-400cc/100 litre su ile püskürtme yapılmalıdır.

Bağlarda: Çiçeklenmeden önce en az bir defa sonra düzenli aralıklarla yapraktan 250-300 cc / 100 litre su ile uygulama tekrarlanmalıdır.

Narenciye: Çiçeklenme döneminden hemen önce, petal yapraklarının düşme döneminde ve 4 hafta aralıklarla yapraktan 400-600cc/100 litre su uygulama yapılır.

Zeytinlerde: Eksikliğin görüldüğü/ihtiyaç duyulan dönemlerde yapraktan 250-300 cc / 100 litre su ile uygulama yapılır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vb.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Garanti edilen içerik

%(w /w)

Toplam Azot (N)**%7****Amonyum Azotu (NH₄-N)****%7****Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P₂O₅)****%29**

İTHALATÇI FİRMA
NEKTAR TARIM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
AOSB 2. Kısım Mahallesi, 24. Cadde
No: 2 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 40
Faks: 0 242 258 01 48
info@nektartarim.com
www.nektartarim.com

ÜRETİCİ FİRMA
SPRAYGRO LIQUID
FERTILIZERS PYT. LTD.
52 Bedford Street, Gilmann,
South Australia 5013 PO Box
Tel:00 618 8447 7266
Faks:00 618 8240 1844



ÇÖZÜNÜRLÜK : Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI : Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az **3 yıl** süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + **5 ile + 40 °C** derece arasında olmalıdır.

UYARILAR : *Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, Teması halinde bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerleri aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

LİSANS NO : 116
TESCİL NO : 2022TK4073
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULL. TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET: 10 L