

Cupper Plane

EC Fertilizer
Bakırlı Gübre Çözeltisi
(Bakır Sülfat İçerikli)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Suda Çözünür Bakır (Cu)

% 6

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



ULUÇINAR
TARIM

EC Fertilizer
Bakırlı Gübre Çözeltisi
(Bakır Sülfat İçerikli)

Cupper Plane

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Suda Çözünür Bakır (Cu)

% 6

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



ULUÇINAR
TARIM

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYARILAR

- * Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Överlen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklık arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve yanlışlıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.

Ürünün, spesifikasyonu uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisine altındadır.

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU (100 L su / da)	UYGULAMA DOZU (dekar)
BARBECUE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlama dönemlerinde her uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFALY KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlama dönemlerinde her uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Her yıl 2-3 cm bariyer, toprak altına dönerken, Çiçeklenme dönemi, toprak ve toprak altına her 10-15 g / da	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP PİSTİA, FENİK	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlama dönemlerinde her uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama ve hasat dönemine kadar ki göz dönemine bağlama	50-100 g	250-500 g / da
MALZ	Buğday dönemi	50-100 g	250-500 g / da
KÜL İÇER	Fidelerden önce	50-100 g	250-500 g / da
SOMATEL, SİBER	Birinci B. dönemlerinde (2. çapraz kısırd) 2. çapraz kısırdan sonra (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, PATLİCAN	Birinci B. dönemlerinde (2. çapraz kısırd) 2. çapraz kısırdan sonra (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARBUR	Birinci B. dönemlerinde (2. çapraz kısırd) 2. çapraz kısırdan sonra (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Selajın dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCEK, NOHUT	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama ve hasat dönemlerinde her 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFENİÇİ	Çiçeklenme dönemi	50-100 g	200-400 g / da
PANKAK, AYÇİĞEĞİ, MİSİR, KANDULA vb.	Hasat gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
CELTİK	Hasat gelişim döneminde 10 gün önce ve 2 hafta önce	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her gelişimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SEFALY PANCAR, ZUTUN	Hasat gelişim dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDELERİ	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlama dönemlerinde her 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
KURUBAT	Hasat gelişim dönemi	50-100 g	250-500 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her gelişimden sonra	50-80 g	200-400 g / da

NET: 400 gr

TESCİL NO : 2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısm Mahallesi 24. Cadde No:2 Dışmetsit / ANTALYA
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolukimya.com.tr - www.merkezanadolukimya.com.tr

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(w/w)

Organik Madde	% 35
Toplam Azot (N)	% 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Alginik Asit	% 1
Serbest Aminoasitler	% 9
Maksimum Nem	% 20
Maksimum Klor (Cl)	% 6,5
pH	(6,4-8,4)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



merkez
ANADOLU KİMYA

NET: 400 gr

TESCİL NO : 2025T06462
LİSANS NO : 029
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısm Mahallesi 24. Cadde No:2 Dışmetsit / ANTALYA
merkez ANADOLU KİMYA info@merkezanadolukimya.com.tr - www.merkezanadolukimya.com.tr

UYARILAR

- * Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Överlen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklık arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamız kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve yanlışlıklardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.

Ürünün, spesifikasyonu uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisine altındadır.

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU (100 L su / da)	UYGULAMA DOZU (dekar)
BARBECUE	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	50-100 g	250-500 g / da
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlama dönemlerinde her uygulama	50-100 g	250-500 g / da
SEFALY KAYI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK vb.	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlama dönemlerinde her uygulama	50-100 g	250-500 g / da
BAĞ	Her yıl 2-3 cm bariyer, toprak altına dönerken, Çiçeklenme dönemi, toprak ve toprak altına her 10-15 g / da	50-100 g	250-500 g / da
ANTEP PİSTİA, FENİK	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlama dönemlerinde her uygulama	50-100 g	250-500 g / da
ZEYTİN	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama ve hasat dönemine kadar ki göz dönemine bağlama	50-100 g	250-500 g / da
MALZ	Buğday dönemi	50-100 g	250-500 g / da
KÜL İÇER	Fidelerden önce	50-100 g	250-500 g / da
SOMATEL, SİBER	Birinci B. dönemlerinde (2. çapraz kısırd) 2. çapraz kısırdan sonra (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, PATLİCAN	Birinci B. dönemlerinde (2. çapraz kısırd) 2. çapraz kısırdan sonra (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KAVUN, KARBUR	Birinci B. dönemlerinde (2. çapraz kısırd) 2. çapraz kısırdan sonra (2-3 uygulama)	50-80 g	200-400 g / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Selajın dönemi boyunca	50-100 g	250-500 g / da
MERCEK, NOHUT	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama ve hasat dönemlerinde her 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
YERFENİÇİ	Çiçeklenme dönemi	50-100 g	200-400 g / da
PANKAK, AYÇİĞEĞİ, MİSİR, KANDULA vb.	Hasat gelişim döneminde minimum 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
CELTİK	Hasat gelişim döneminde 10 gün önce ve 2 hafta önce	50-100 g	250-500 g / da
ÇAY	Her gelişimden sonra	50-100 g	250-500 g / da
SEFALY PANCAR, ZUTUN	Hasat gelişim dönemi	50-100 g	250-500 g / da
MEYVE FIDELERİ	Çiçeklenme bağlama, meyve bağlama, meyve gelişim ve hasatlama dönemlerinde her 2 uygulama	50-100 g	250-500 g / da
KURUBAT	Hasat gelişim dönemi	50-100 g	250-500 g / da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her gelişimden sonra	50-80 g	200-400 g / da