

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN                                       | UYGULAMA DÖNEMİ                          | UYGULAMA DOZU |                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                            |                                          | YAPRAKTAN     | YAĞMURLA DAMLAMA |
| NARENCİYE                                  | % 80 Çiçekte Meyve Büyüme Dönemi         | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ELMA, ARMUT vb.                            | % 80 Çiçekte Meyve Büyüme Dönemi         | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR | % 80 Çiçekte Meyve Büyüme Dönemi         | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| BAG                                        | Salkım Uzatma Dönemi Tane Şişirme Dönemi | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK                      | Tane Dolum Dönemi                        | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ZEYTİN                                     | Meyve Tutumu Dönemi Meyve Büyüme Dönemi  | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| MUZ                                        | Parmak Dolum Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| KİVİ, İNCİR                                | Meyve Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| DOMATES, BIBER                             | Meyve Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| HIYAR, PATLICAN                            | Meyve Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| KAVUN, KARPUZ                              | Meyve Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK                           | Çiçek Gelişim Dönemi                     | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| MERCİMEK, NOHUT                            | Çiçeklenme Öncesi                        | 250cc/100 lt  | -                |
| YERFISTIĞI                                 | Tane Dolum Dönemi                        | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.         | Bitkiler 30-40 cm Olduğunda              | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ÇELTİK                                     | Kardeşlenme Dönemi                       | 250cc/100 lt  | -                |
| ÇAY                                        | Biçimden Sonra                           | 250cc/100 lt  | -                |
| ŞEKER PANCARI                              | Yumru Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| MEYVE FIDANLARI                            | Gelişim Dönemi                           | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| HUBUBAT                                    | Kardeşlenme Dönemi                       | 250cc/100 lt  | -                |
| YEŞİL ALAN BITKİLERİ                       | Her Biçimden Sonra                       | 250cc/100 lt  | -                |

**NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakтан uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprakтан uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda , muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekte birlikte tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

**ÜRETİCİ FİRMA**  
**ULUÇINAR**  
TARIM  
**ULUÇINAR TARIM İLÇ. THM. GÜB. PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.**  
ORGANİZE SAN. BÖL.  
2.KSM. 24. CAD. ANTALYA  
TEL.: 0 242 258 01 40  
FAX: 0 242 258 01 48  
info@ulucinartarim.com  
www.ulucinartarim.com

ORGANİK ÜRÜNLER

Hayvansal Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

Plane Amin

UYARILAR

- \* Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- \* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- \* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- \* Önerilen dozajı aşmayınız.
- \* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- \* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- \* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- \* **ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞEBİLDİĞİ TOPRAĞA UYGULANAMAZ.**
- \* **UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILAMAZ VEYA BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAMAZ.**

**DEPOLAMA**  
Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**FİRMA BEYANI**  
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

**KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR**

- \* Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- \* Kuvvetli alkali (Yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (Düşük Ph), klor, organik, fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- \* Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- \* Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçerek sorunuz.
- \* Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız).
- \* Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önlemi alınması diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- \* Üretici firma veya bayi ile temas kurmadığınız durumda: şeffaf bir kap içerisine 100 cc su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 gr üründen koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz malzemeden 1 ya da 2 gr ekleyiniz.Eğer çökme, suda çözünmeyen malzemelerin oluşumu kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız.Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketindeki ve tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2022TO2865  
LİSANS NO : 1666  
PARTİ NO :  
ÜRETİM TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 20 L

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN                                       | UYGULAMA DÖNEMİ                          | UYGULAMA DOZU |                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                            |                                          | YAPRAKTAN     | YAĞMURLA DAMLAMA |
| NARENCİYE                                  | % 80 Çiçekte Meyve Büyüme Dönemi         | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ELMA, ARMUT vb.                            | % 80 Çiçekte Meyve Büyüme Dönemi         | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR | % 80 Çiçekte Meyve Büyüme Dönemi         | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| BAG                                        | Salkım Uzatma Dönemi Tane Şişirme Dönemi | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK                      | Tane Dolum Dönemi                        | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ZEYTİN                                     | Meyve Tutumu Dönemi Meyve Büyüme Dönemi  | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| MUZ                                        | Parmak Dolum Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| KİVİ, İNCİR                                | Meyve Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| DOMATES, BIBER                             | Meyve Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| HIYAR, PATLICAN                            | Meyve Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| KAVUN, KARPUZ                              | Meyve Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK                           | Çiçek Gelişim Dönemi                     | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| MERCİMEK, NOHUT                            | Çiçeklenme Öncesi                        | 250cc/100 lt  | -                |
| YERFISTIĞI                                 | Tane Dolum Dönemi                        | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.         | Bitkiler 30-40 cm Olduğunda              | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| ÇELTİK                                     | Kardeşlenme Dönemi                       | 250cc/100 lt  | -                |
| ÇAY                                        | Biçimden Sonra                           | 250cc/100 lt  | -                |
| ŞEKER PANCARI                              | Yumru Büyüme Dönemi                      | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| MEYVE FIDANLARI                            | Gelişim Dönemi                           | 250cc/100 lt  | 1-3 lt/da        |
| HUBUBAT                                    | Kardeşlenme Dönemi                       | 250cc/100 lt  | -                |
| YEŞİL ALAN BITKİLERİ                       | Her Biçimden Sonra                       | 250cc/100 lt  | -                |

**NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakтан uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprakтан uygulanabilir. Tüm sebzelerde, meyve ağaçlarında, bağlarda , muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekte birlikte tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

**ÜRETİCİ FİRMA**  
**ULUÇINAR**  
TARIM  
**ULUÇINAR TARIM İLÇ. THM. GÜB. PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.**  
ORGANİZE SAN. BÖL.  
2.KSM. 24. CAD. ANTALYA  
TEL.: 0 242 258 01 40  
FAX: 0 242 258 01 48  
info@ulucinartarim.com  
www.ulucinartarim.com

ORGANİK ÜRÜNLER

Hayvansal Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

Plane Amin

UYARILAR

- \* Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- \* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- \* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- \* Önerilen dozajı aşmayınız.
- \* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- \* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- \* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- \* **ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞEBİLDİĞİ TOPRAĞA UYGULANAMAZ.**
- \* **UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILAMAZ VEYA BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAMAZ.**

**DEPOLAMA**  
Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur. Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**FİRMA BEYANI**  
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

**KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR**

- \* Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.
- \* Kuvvetli alkali (Yüksek Ph) ve kuvvetli asitlerle (Düşük Ph), klor, organik, fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.
- \* Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü koyarak karışımı hazırlayınız.
- \* Tavsiye edilenin dışında, başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçerek sorunuz.
- \* Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. (Eldiven ve gözlük takınız).
- \* Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önlemi alınması diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz.
- \* Üretici firma veya bayi ile temas kurmadığınız durumda: şeffaf bir kap içerisine 100 cc su koyunuz. İçerisine 1 ya da 2 gr ürün den koyup çözünüz.Daha sonra karıştırmak istediğiniz malzemeden 1 ya da 2 gr ekleyiniz.Eğer çökme, suda çözünmeyen malzemelerin oluşumu kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız.Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketindeki ve tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2022TO2865  
LİSANS NO : 1666  
PARTİ NO :  
ÜRETİM TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET : 20 L

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK                          | (w/w)     |
|------------------------------------------------|-----------|
| Organik Madde                                  | % 35      |
| Toplam Azot (N)                                | % 6       |
| Amonyum Azotu (NH <sub>4</sub> -N)             | % 3       |
| Organik Azot (N)                               | % 3       |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | % 9       |
| Alginik Asit                                   | % 1       |
| Serbest Aminoasitler                           | % 9       |
| Maksimum Nem                                   | % 20      |
| Maksimum Klor (Cl)                             | % 6,5     |
| pH                                             | (6,4-8,4) |

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!  
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

algimac

NK'lı Katı Organomineral Gübre

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN                                       | UYGULAMA DÖNEMİ                                                                                             | UYGULAMA DOZU             |                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                            |                                                                                                             | YAPRAKTAN (100 L su / da) | YAĞMURLA DAMLAMA (dağıtıcı) |
| NARENCİYE                                  | Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar                                             | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| ELMA, ARMUT vb.                            | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama                     | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERIK ve NAR | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama                     | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| BAG                                        | Surgunlar 3-5 cm iken, salkım uzatma dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri klorak, tozlu su şişirme dönemi | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK                      | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama                     | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| ZEYTİN                                     | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki gaz dönemi boyunca                           | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| MUZ                                        | Doğum öncesi                                                                                                | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| KİVİ, İNCİR                                | Filtelenme evresi                                                                                           | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| DOMATES, BIBER                             | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)                         | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| HIYAR, PATLICAN                            | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)                         | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| KAVUN, KARPUZ                              | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasata kadar (2-3 uygulama)                         | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK                           | Gelişim dönemi boyunca                                                                                      | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| MERCİMEK, NOHUT                            | Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama                                                                 | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| YERFISTIĞI                                 | Çiçeklenme öncesi                                                                                           | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb.         | Erken gelişim döneminde minimum 2 uygulama                                                                  | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| ÇELTİK                                     | Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama                                                             | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| ÇAY                                        | Her biçimden sonra                                                                                          | 50-100 g                  | 500 ml - 1L                 |
| ŞEKER PANCARI, TOTOİL                      | Yumru büyüme dönemi                                                                                         | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| MEYVE FIDANLARI                            | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde Ter uygulama                     | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |
| HUBUBAT                                    | Kardeşlenme dönemi                                                                                          | 50-100 g                  | -                           |
| YEŞİL ALAN BITKİLERİ                       | Her biçimden sonra                                                                                          | 50-100 g                  | 250-500 g / da              |

UYARILAR

- \* Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- \* Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- \* Önerilen dozajı aşmayınız.
- \* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- \* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- \* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

**DEPOLAMA**

- \* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- \* Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**FİRMA BEYANI**  
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

NET : 1 kg

ÜRETİCİ FİRMA : MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.  
A.Ö.SB. 2.Kism Mahallesi 24. Cadde No:2 Döşemeada / ANTALYA  
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48  
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

TESCİL NO : 2025TO6462  
LİSANS NO : 029  
PARTİ NO :  
ÜRETİM TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.