

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.



ULUÇINAR TARIM İLAÇ. TOHUM
GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ
2.KISIM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinartarim.com

S-80 SC FORMUNDA

Elementel Sıvı Kükürt

S-80

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJLARI

	Yapraktan Uygulama	Damlama Topraktan Uygulama
Sebzelerde	150 - 200 ml	500-750 ml
Meyvelerde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml
Tahıllar, Endüstri Bitkilerinde	150 - 200 ml	500 - 750 ml
Süs Bitkilerinde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml

KÜKÜRTÜN BİTKİLER İÇİN ÖNEMİ:

Kükürt vitamin H ve vitamin B1'in yapı taşıdır. Sistein ve Metionin aminoasitlerinin bileşenidir. Bitkilerde kükürt (S) noksanlığında kök hidrolik geçirgenliği, stoma açıklıkları ve fotosentez azalır. Kükürt noksanlığında protein sentezi azalır.

ÜRETİM TARİHİ :

PARTİ NO :

SON KULLANMA TARİHİ :

NET: 20 L

UYARILAR

- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C /+ 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az **3 yıl** korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.



ULUÇINAR TARIM İLAÇ. TOHUM
GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ
2.KISIM 24 CAD. ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40
www.ulucinartarim.com

S-80 SC FORMUNDA

Elementel Sıvı Kükürt

S-80

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJLARI

	Yapraktan Uygulama	Damlama Topraktan Uygulama
Sebzelerde	150 - 200 ml	500-750 ml
Meyvelerde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml
Tahıllar, Endüstri Bitkilerinde	150 - 200 ml	500 - 750 ml
Süs Bitkilerinde	200 - 250 ml	500 - 1000 ml

KÜKÜRTÜN BİTKİLER İÇİN ÖNEMİ:

Kükürt vitamin H ve vitamin B1'in yapı taşıdır. Sistein ve Metionin aminoasitlerinin bileşenidir. Bitkilerde kükürt (S) noksanlığında kök hidrolik geçirgenliği, stoma açıklıkları ve fotosentez azalır. Kükürt noksanlığında protein sentezi azalır.

ÜRETİM TARİHİ :

PARTİ NO :

SON KULLANMA TARİHİ :

NET: 20 L

DİKKAT KIRILIR



FRAGILE

DİKKAT KIRILIR



FRAGILE