

EC FERTILIZER

Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

ZnBoM



Garanti Edilen İçerik	% (W/W)
Suda Çözünür Bor (B)	3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	10
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	10

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.!



EC FERTILIZER

Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

ZnBoM



Garanti Edilen İçerik	% (W/W)
Suda Çözünür Bor (B)	3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	10
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	10

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.!



EC FERTILIZER

Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

ZnBoM



Garanti Edilen İçerik	% (W/W)
Suda Çözünür Bor (B)	3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	10
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	10

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.!



EC FERTILIZER
Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

ZnBoM



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ŞEFTALİ, KAYIŞI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
KIVI, INCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
MERCİMEK	İlk çiğşktan itibaren	70-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
YER FISTIĞI	İlk çiğşktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
PAMUK, AVCIĞEĞİ, MISIR, TÖTÖN vb.	İlk çiğşktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
CELTIK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ŞEKER PANCARLI TÖTÖN	İlk çiğşktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
MEYVE FİDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	İhtiyaç duyuldukdça 2-3 kez uygulanır	200-300 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²

***NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm Sebze, meyve, ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalarından uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. *Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız. *Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 5 yıl korur. *Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. *Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2021TK1925
LİSANS NO : 2130
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 5 yıldır.

NET : 1 kg



ÜRETİCİ FİRMA
ZENO TARIM KİMYA GÜBRE ZİRAİ
İLAC PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
YÖTİLER MAH. E 107 SOK. NO:35/21
YILDIRIM/BURSA
Tel/Fax: 0 224 341 62 61

EC FERTILIZER
Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

ZnBoM



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ŞEFTALİ, KAYIŞI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
KIVI, INCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
MERCİMEK	İlk çiğşktan itibaren	70-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
YER FISTIĞI	İlk çiğşktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
PAMUK, AVCIĞEĞİ, MISIR, TÖTÖN vb.	İlk çiğşktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
CELTIK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ŞEKER PANCARLI TÖTÖN	İlk çiğşktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
MEYVE FİDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	İhtiyaç duyuldukdça 2-3 kez uygulanır	200-300 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²

***NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm Sebze, meyve, ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalarından uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. *Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız. *Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 5 yıl korur. *Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. *Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2021TK1925
LİSANS NO : 2130
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 5 yıldır.

NET : 1 kg



ÜRETİCİ FİRMA
ZENO TARIM KİMYA GÜBRE ZİRAİ
İLAC PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
YÖTİLER MAH. E 107 SOK. NO:35/21
YILDIRIM/BURSA
Tel/Fax: 0 224 341 62 61

EC FERTILIZER
Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

ZnBoM



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ELMA, ARMUT vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ŞEFTALİ, KAYIŞI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
BAG	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
KIVI, INCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
KAVUN, KARPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
MERCİMEK	İlk çiğşktan itibaren	70-100 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
YER FISTIĞI	İlk çiğşktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
PAMUK, AVCIĞEĞİ, MISIR, TÖTÖN vb.	İlk çiğşktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
CELTIK	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
ŞEKER PANCARLI TÖTÖN	İlk çiğşktan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
MEYVE FİDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	İhtiyaç duyuldukdça 2-3 kez uygulanır	200-300 gr/100 lt su	0,5 - 1 kg/1000m ²

***NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir. Tüm Sebze, meyve, ağaçlarında, bağlarda, muz ve narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0,5 ile 1 kg arasındadır.

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalarından uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. *Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız. *Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / +45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 5 yıl korur. *Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. *Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 2021TK1925
LİSANS NO : 2130
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 5 yıldır.

NET : 1 kg



ÜRETİCİ FİRMA
ZENO TARIM KİMYA GÜBRE ZİRAİ
İLAC PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
YÖTİLER MAH. E 107 SOK. NO:35/21
YILDIRIM/BURSA
Tel/Fax: 0 224 341 62 61