

## UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN                                       | UYGULAMA DÖNEMİ                 | UYGULAMA DOZU         |                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                            |                                 | YAPRAKTAN             | TOPRAKTAN                    |
| NARENCİYE                                  | Çiçeklenme öncesi               | 200-250 ml / 100 L su | 1 L / 1000m <sup>2</sup>     |
| ELMA, ARMUT vb.                            | Çiçeklenme öncesi               | 200-250 ml / 100 L su | 1 L / 1000m <sup>2</sup>     |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR | Çiçeklenme öncesi               | 200-250 ml / 100 L su | 1 L / 1000m <sup>2</sup>     |
| BAĞ                                        | Çiçeklenme öncesi               | 150-200 ml / 100 L su | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK                      | Çiçeklenme öncesi               | 200-250 ml / 100 L su | 1 L / 1000m <sup>2</sup>     |
| ZEYTİN                                     | Çiçeklenme öncesi               | 200-250 ml / 100 L su | 1 L / 1000m <sup>2</sup>     |
| MUZ                                        | Çiçeklenme öncesi               | 200-250 ml / 100 L su | 1 L / 1000m <sup>2</sup>     |
| KIVI, İNCİR                                | Çiçeklenme öncesi               | 200-250 ml / 100 L su | 1 L / 1000m <sup>2</sup>     |
| DOMATES, BİBER                             | Çiçeklenme öncesi               | 50-100 ml / 100 L su  | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| PATATES                                    | Çiçeklenme öncesi               | 200-250 ml / da       | 2-3 L / 1000m <sup>2</sup>   |
| HIYAR, PATLICAN                            | Çiçeklenme öncesi               | 50-100 ml / 100 L su  | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| KAVUN, KARPUZ                              | Çiçeklenme öncesi               | 50-100 ml / 100 L su  | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK                           | Çiçeklenme öncesi               | 50-100 ml / 100 L su  | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| MERCİMEK                                   | Çiçeklenme öncesi               | 70-100 ml / 100 L su  | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| YERFISTIĞI                                 | Çiçeklenme öncesi               | 100-150 ml / 100 L su | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.                 | Bitkiler 40-50 cm iken          | 100-150 ml / 100 L su | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| ÇELTİK                                     | Kardeşlenme dönemi              | 100-150 ml / 100 L su | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| ÇAY                                        | Filizlenme dönemi               | 100-150 ml / 100 L su | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| ŞEKER PANCARI                              | Yumru oluşum dönemi             | 100-150 ml / 100 L su | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| MEYVE FİDANLARI                            | Gelişim dönemi boyunca t-2 defa | 200-250 ml / 100 L su | 1 L / 1000m <sup>2</sup>     |
| HUBUBAT                                    | Kardeşlenme dönemi              | 200-250 ml / 100 L su | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |
| YEŞİL ALAN BİTKİLERİ                       | Her biçimden sonra              | 200-300 ml / 100 L su | 0,5-1 L / 1000m <sup>2</sup> |

## EC FERTİLİZER

Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)  
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

# Clo-BZn

### GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Bor (B)  
Suda Çözünür Çinko (Zn)

(w/w)

% 0,2  
% 8,5

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



### UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları asla başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

### DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C ile + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

### FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünü; spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

**Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.**

TESCİL NO :  
LİSANS NO :  
PARTİ NO :  
ÜRETİM TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

# NET :

### ÜRETİCİ FİRMA

**Clone**  
KİMYA

**Clone**  
KİMYA

CLONE KİMYA TARIM SAN.TİC. LTD. ŞTİ.  
AOSB 3.Kısım Mh. 25.Cad. No: 15  
Döğemealtı /ANTALYA  
T +90 242 258 01 40 (pbx)  
F +90 242 258 01 48  
info@clone.com.tr  
www.clone.com.tr