

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat),
 Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
 Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Micro Axor

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)	%1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 1
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 6

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR:

- * Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz
- * Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız
- * Yutmayınız. Yutulması halinde doktorunuza başvurunuz
- * Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir .

TAVSİYELER:

- * Bitkilerin ihtiyacına göre yetiştirme sezonu boyunca damlamadan veya yapraktan uygulanabilir
* Bordo bulamacı ve alkali ilaçlar hariç diğer bitki besleme ürünleri ve zirai ilaçlar ile karışabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Ürünü kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, 0 °C / +40°C arasında depolayınız. Ürünü, ambalajı açık olarak asla depolamayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve karışımlar neticesinde meydana gelen olumsuzluklar ile depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KİVİ, İNCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KAVUN, KAPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-100 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ÇELTİK .	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MEYVE FİDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde	200-250 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²
Yeşil Alan bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	200-300 g/100 L su	0.5 -1 kg/1000 m ²

Tescil No: 32416

Lisans No: 2055

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sora 3 Yıldır.

Ürün parti no: Kapakta yazmaktadır.

Ürünün Garanti edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri ;

Net ağırlık: 0,25 - 0,5 - 1 - 2-2,5-3-4- 5 - 10 - 15 - 20 – 25-30-35-40-45-50 kg

ÜRETİCİ : AGROAXOR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YÜKSEKALAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA CAD. ÇİL İŞHANI 41 12 MURATPAŞA ANTALYA

TEL& FAX: 02423111205

ETİKET BİLGİSİNİN AYNISI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 7223 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMLERİ PEŞİNEN KABUL EDERİZ

