

UYARILAR

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.

*Sadece gerekli olan yer ve zamanda kullanınız.

*Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.

*Maske, gözlük ve eldiven kullanınız.

*Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.

*Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız.

*Gübreleme tozlarını teneffüs etmeyiniz.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLME ÖZELLİĞİ

Diğer taban gübreleri, ilaçlar ve sıvı gübrelerle birlikte karıştırılarak kullanılabilir. Şüpheli durumlarda karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, + 5 ile +40°C sıcaklıkta saklanmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında ürünler ters çevrilmemelidir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.



Lisans No :
Tescil No :
Parti/Seri No : Ambalajın üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.
Son Kullanma : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Net Hacim:



QUATROMAX

ORGANİK GÜBRE BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

QUATRO
MAX

Garanti Edilen İçerik : % w/w

Toplam Organik Madde : % 40
Organik Karbon (C) : % 12
Organik Azot (N) : % 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) : % 2
pH Aralığı : 4-6



QUATROMAX

ÖNERİLEN KULLANMA ŞEKLİ, ZAMANI VE DOZLARI

Bitki Adı	Uygulama Miktarı ve Şekli		Uygulama Zamanı
	Damlama Sulama ile Uygulama	Yapraktan Uygulama	
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs.	4-5 L/da	100 L suya 100-150 ml	Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar.
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soğan, Havuç, Patates, Çilek vs.)	4-5 L/da	100 L suya 100-150 ml	Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar.
Tüm Yapraklı Yenen Kışkık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvrık, Aysberg v.s.)	3-4 L/da	100 L suya 100-150 ml	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.
Kavun, Karpuz, Kabak v.s	3-4 L/da	100 L suya 100-150 ml	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.
Fidanlık, Süs Bitkileri vs	2 L/da	100 L suya 100-150 ml	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.
Tüm Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Zeytin ve Narenciye v.s.)	4-5 L/da veya ağaç başına 200-250 ml	100 L suya 100-150 ml	Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1.Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2. Meyve oluşumunda 3. Hasat sonuna kadar.
Tüm Endüstri Bitkileri (Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şeker Pancarı v.s.)	3-4 L/da	100 L suya 100-150 ml	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek, Mısır v.s.)	—	100 L suya 100-150 ml	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2 tekrerde uygulanır.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



ÜRETİCİ FİRMA

AGROQUATRO Organik Tarım San. Tic. A.Ş.
Egemenlik Mah. 6106/15 Sk. No:13 Bornova İzmir Türkiye
Tel/Fax: +90 232 273 60 60
www.agroquatro.com
info@agroquatro.com

Piyasa sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

AGROQUATRO ORG. TAR.

SAN. VE TİC. A. Ş.

Egemenlik Mah. 6106/15 Sok. No:13

Bornova / İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 008 082 0620

Şirket Vekili
Burak Kişin