

EC FERTILIZER

Genesis

NPK Gübresi Harmanlanmış

13-40-13+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Toplam Azot (N)	13
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	3,8
Amonyum Azotu (NH ₄ N)	7,8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	1,4
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	40
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	40
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	13
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,005
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,02

NET :

Genesis

EC FERTILIZER

Genesis

NPK Gübresi Harmanlanmış

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

13-40-13+ME			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
BAĞ	Filizlenme başlangıcı	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
MUZ	Doğum öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama	200 g/100 L suya	1-3 kg/da
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme öncesi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
DOMATES, BIBER	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN, KAPUZ	Çiçeklenme dönemi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
MERCİMEK, NOHUT	Çiçeklenme dönemi	200-250 g/da	-
YERFISTIĞI	Çiçeklenme dönemi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb	Bitkiler 20-30 cm iken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 g/da	2-4 kg/da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	200-300 g/da	-
ÇAY	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-2 kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumur oluşumu dönemi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	2-3 kg/da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	200-300 g/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi boyunca	200-250 g/da	-

APPLICATION DOSES AND USAGE PERIODS

13-40-13+ME			
CROP	APPLICATION PERIOD	APPLICATION DOSAGE	
		FOLIAR	SOIL
CITRUS	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da
APPLE, PEAR ETC.	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da
PEACH, APRICOT, CHERRY, SOUR CHERRY, PLUM and POMEGRANATE	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da
VINEYARD	Beginning of shooting	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
PISTACHIO, HAZELNUT	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da
OLIVE	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da
BANANA	2 applications with 15 days interval before bunch emergence	200 g/100 L water	1-3 kg/da
KIWİ, FIG	Before Flowering	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da
TOMATO, PEPPER	Flowering period: 3 applications with 15 days intervals	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
CUCUMBER, EGGPLANT	Flowering period: 3 applications with 15 days intervals	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
MELON, WATERMELON	Flowering period: 3 applications with 15 days intervals	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
CUT FLOWER	3 applications during growth period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
LENTIL, CHICKPEA	Flowering period	200-250 g/da	-
PEANUT	Flowering period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
COTTON, SUNFLOWER, CORN, CANOLA, TOBACCO ETC.	2 applications with 15 days interval when the plants are 20-30 cm	200-250 g/da	2-4 kg/da
RICE	Tillering period	200-300 g/da	-
TEA PLANT	2 applications during growth period	200-250 g/100 L water	1-2 kg/da
SUGAR BEET	2 applications tuber formation	200-250 g/100 L water	2-3 kg/da
FRUIT SAPLING	2 applications during growth period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
CEREALS	Tillering period	200-300 g/da	-
GREEN AREAS	During growth period	200-250 g/da	-

UYARILAR : • Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz. • Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alan yerlerde kullanınız. • Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. • Temas halinde bol su ile yıkayınız. • Önerilen doza aşmayınız. • Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. • Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. • Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA: • Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. • Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. • Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI : İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve koşullardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece,ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksiinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezaî işlemleri, peşinen kabul ederiz.

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



Tescil No / Reg. No :
Lisans No / Lic. No : 199
Üretim Tarihi / Prod. Date :
Son Kullanma Tarihi / Exp. Date :
Parti No / Lot No :

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

COUNTRY OF ORIGIN: TÜRKİYE