

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 31.05.2024 / 13168
KULLANILDIĞI BİTKİ, ZARARLI VE DOZU

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU
MANDARIN	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	4 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı) 2 adet / ha (Monitör amaçlı)
PORTAKAL	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	4 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı) 2 adet / ha (Monitör amaçlı)
GREYFURT	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	4 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı) 2 adet / ha (Monitör amaçlı)
LİMON	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	4 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı) 2 adet / ha (Monitör amaçlı)
MİSKET LİMONU	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	2 adet / ha (Monitör amaçlı)
ŞEFTALİ	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	8 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı)
NEKTARIN	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	8 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı)
KAYISI	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	8 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı)
ERİK	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	8 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı)
NAR	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	4 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı)
TRABZON HURMASI	Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)	8 adet/da (Kitlese mücadele amaçlı)

TUZAĞIN KULLANIM ZAMANI

Feromon tuzaklar kitlese ve izleme (monitör) amaçlı kullanılır.

İZLEME (Monitör) AMAÇLI meyvenin türü ve çeşidine göre, meyvelerde gelişmenin tamamlanmış, tatlanmanın başladığı ben düşme döneminden en az 1 ay önce asılmalıdır.

KİTLESEL MÜCADELE AMAÇLI meyvenin renk değişiminden 40 gün önce ya da en geç hasattan 50-60 gün önce asılmalıdır.

TUZAĞIN HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ

İZLEME (Monitör) AMAÇLI tuzak gövdesi, konik şeklindeki plastik tuzak kabı ve deltamethrin emdirilmiş plastik şeffaf tuzak kapağından oluşur. Tuzak gövdesi içine cezbedici içeren yayıcı konur. Yayıcı poşetinin kesilmesi veya açılması gerekmez. Yayıcının ömrü 180 gündür.

KİTLESEL MÜCADELE AMAÇLI atraktant, tuzak deliklerini kapatmayacak şekilde tuzak gövdesine yerleştirilir. Kapak, tuzak gövdesi üzerine yerleştirilerek kapatılır. Tuzaklar ağaçların güney tarafına yerden 1,4-1,8 metre yükseklikteki dallara asılmalıdır. Tuzak gövdesindeki deliklerin herhangi bir dal veya ağaç yaprağı tarafından engellenmesi kontrol edilmelidir. Normal hava koşulları altında tuzak 180 günlük etkin koruma sağladığı için her sezonda tek uygulama yapılması yeterlidir. Ürün içerisinde bulunan deltamethrin tuzak kapağı iç kısmında sürülüdür. Ürün için hiçbir şekilde çevre, bitki ve toprak ile temas etmez. Bu yüzden NEKTEC'in meyve üzerinde kalıntıya sebep olması söz konusu değildir.

"NEKTEC" hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz."

nektar

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ

NEKTEC

GRUBU	3A	FEROMON VE TUZAK
-------	----	------------------

7,8 g Ammonium acetate + 1,04 g Trimethylamine
hydrochloride + 0,034 g Kadavarin (1,5- Diamino pentane)
0,015 g Deltamethrin + Tuzak

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- SICAK VE ATEŞTEN UZAK TUTUNUZ.
- TUZAK İÇERİSİNDEKİ FEROMON DELTAMETRİNLİ KAPAĞIN DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- SOLUMAYINIZ, SİGARA İÇMEYİNİZ
- UYGULAMA SIRASINDA ELDİVEN KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ: Deri ve göz ile temasından veya solunumu durumunda yanmalar, öksürük, ısıklık benzeri ses, larenjit, sık sık soluk alma migren mide bulantısı ve kusma görülebilir.

En önemli Akut & Gecikmeli Belirtiler ve Etkileri

Semptomlar:

Lokal: Cilt ile temas halinde: parestezi (lokal), cilt ve mukoza zarında tahriş ihtimali mevcuttur. **Sistemik:** Ajitasyon, gastrointestinal rahatsızlık, titreme, baş dönmesi, baş ağrısı, dekadans, bulantı ve kusma, epigastrik ağrı, kas faskülasyonu, bilinç kaybı, konvülsiyonlar ve koma (yüksek dozajlarda).

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Şüphe durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde dair belirtiler devam ederse tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermemeyin.

Solumum: Yangın durumunda mağduru açık havaya çıkarın. Hızlı bir iyileşme sağlanmazsa tıbbi yardım alın..

Göz ile temas: Gözleri açık tutarak hemen bol su ile en az 14 dakika boyunca yıkayın.

Cilt ile temas: Kontamine olmuş kıyafetleri çıkarın. Cildi su ve sabun yada uygun bir cilt temizleyici kullanarak yıkayın.

Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Ağızınızı su ile çalkalayın. Sakin kalın. Tıbbi yardım alın.

Gereken acil tıbbi müdahale ve özel tedavinin belirlenmesi:

Şüphe durumunda veya rahatsızlık hissi devam ederse, tıbbi yardım isteyin. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermemeyin.

Riskler: Bu preparat piretroid içermektedir. Organofosforlu bileşiklerle KARIŞTIRILMAMASI gerekir. Tedavi:

Lokal tedavi: İlk müdahale semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Göz ile temas durumunda: 1%'lik Tetrakain gibi lokal anestetik göz damlaları kullanın. Gerekli takdirde ağrı kesici ilaç kullanın. Sistemik tedavi: Trakeal entübasyon uygulamalı ve gastrik lavaj yapmalı, ardından aktif kömür uygulamalıdır. Kardiyak ve solunum fonksiyonları kontrol edilmeli. EKG kontrolü, Solunum durumunda akciğer ödemi olup oluşmadığını kontrol edin. Solunum yollarını açık tutun. Gerekli takdirde suni solunum yapın..

Konvülsiyonlara karşı olarak: Yetişkinler için: 5-10 mg, çocuklar için 2-5 mg. Diazepam damar yoluyla verilmelidir. Gerekli takdirde hasta sakinleşinceye kadar tekrar ediniz.

Kontrendikasyonlar: Atropin ve adrenalin türevleri.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Bilinen bir antidot yoktur

ZEHRİLENME DURUMUNDA
ULUSAL ZEHRİ MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI SÖZCÜĞÜ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalajı veya etiketi saklayınız.

P102: Çocukların erişemeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: Ürün içeriğini/kabını yetkili bir atık yöneticisine teslim ederek, bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Etikette önerilen şekilde kullanınız. Tuzak kullanılıncaya kadar orijinal ambalajı açılmadan saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Tuzak aslırken koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir. Boş ambalajları atarak çevreyi kirliletmeyiniz.

Feromon tuzağı, oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Alüminyum folyoyu açmayınız.

Depolama Şartları : Oda sıcaklığı (20 °C). Bu koşullar altında ürün 2 yıla kadar muhafaza edilebilir.

FİRMA BEYANI:

Feromon tuzağının kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğu için, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA

SEDQ HEALTHY CROPS, S.L. C/LLull, 41-08005 Barcelona - İspanya
Fabrika Adresi: Camino del Acipres, s/n 22400 Monzon - İspanya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

NEKTAR TARIM TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

Organize Sanayi Gelişim Bölgesi 2. Kısım 24. Cadde

No:2 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48

NEKTAR TARIM TİCARET PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

Organize Sanayi Gelişim Bölgesi 2. Kısım 24. Cad. No:2

Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48 Döşemealtı

Mersis No: 63100346300015 Tic.Sic.No:21021

Antalya Kurumlar V.D.: 631 008 3463 ANTALYA

Metin OCAKTAN
Sirket Vekili